Rennie®

COMPOSITION:
Carbonate de calcium 680,00 mg, carbonate de magnésium lourd 80,00 mg.
Excipients: amidon de pomme de terre, amidon de maïs prégélatinisé, stéarate de magnésium, talc, paraffine liquide légère, arôme menthe, arôme citron, saccharose. Pour un comprimé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:
ANTIACIDE (A : appareil digestif et métabolisme)

EXPLOITANT / FABRICANT:
Bayer Santé Familiale, 33 rue de l'Industrie, 74240 Gaillard – France

INDICATIONS: Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

CONTRE-INDICATIONS:
VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas :
- d'antécédents d'allergie à l'un des composants du comprimé,
- de maladie grave du rein,
- d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

MISES EN GARDE SPECIALES
- **Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :**
  - si vos troubles sont associés à une perte de poids,
  - si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
  - si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
  - si vous souffrez d'une maladie des reins.
- En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
- Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose, mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
- Si vous êtes conduit à dépasser 4 à 8 comprimés par jour, ce traitement devra être de courte durée. Il ne devra pas être poursuivi après la disparition des symptômes.

Vous ne devez pas dépasser 12 comprimés par jour.
- Ce médicament contient 475 mg de saccharose par comprimé : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS

Ce médicament contient des **antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium)**. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.
Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).
SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE / ALLAITEMENT

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE: Saccharose.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).
-Sucez ou croquez 1 à 2 comprimés au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides, soit 4 à 8 comprimés par jour.
-En cas de douleurs plus intenses, la posologie pourra être portée, pour une brève période, à 12 comprimés par jour.
Voie orale.
Respectez la posologie maximale.

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

En cas de surdosage, des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

EFFETS INDESIRABLES
CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
- Possibilité de troubles digestifs (diarrhées).
- A doses fortes et prolongées, survenue possible d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs rénaux et de troubles rénaux graves.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE DE CONSERVATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

NE LAISSER NI A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS
Décembre 2003.

80910658/0108EXFR

Rennie®

COMPOSITION: Calcium carbonate. .....680.00 mg
Magnesium carbonate, heavy.....80.00 mg.
Excipients: potato starch, pregelatinised maize starch, magnesium stearate, talc, light liquid paraffin, mint flavour, lemon flavour, sucrose
For one tablet

PHARMACOTHERAPEUTIC CLASS: ANTIACID (A: gastrointestinal system and metabolism)

DISTRIBUTOR/MANUFACTURER: Bayer Santé Familiale, 33 rue de l'Industrie, 74240 Gaillard – France

INDICATIONS:
This medicine is indicated in adults (from the age of 15 years) for heartburn and acid stomach.

CONTRAINDICATIONS:
YOU MUST NOT TAKE this medicine if you have:
- a history of allergy to one of the ingredients of the medicine,
- serious kidney disease,
- hypercalcaemia (abnormally high concentrations of calcium in the blood).

SPECIAL WARNINGS
- **you should only use this medicine after consulting your doctor if:**
- your disorder is associated with weight loss,
- you have difficulties swallowing or persistent abdominal discomfort,
- you are suffering from indigestion for the first time or if there has been any recent change in this disorder,
- you have kidney disease.
- because it contains sucrose, this medicine should not be used by patients with fructose intolerance, glucose or galactose malabsorption syndrome or sucrase-isomaltase deficiency (rare metabolic diseases).

PRECAUTIONS FOR USE
- If the intensity and/or frequency of your symptoms persist without improvement or worsens after 10 days of treatment, do not increase the dose but consult your doctor or pharmacist.
- If you need to take more than 4 to 8 tablets per day, you should only use this treatment for a short time. You should not continue this treatment after the symptoms have resolved. Do not take more than 12 tablets per day.
- This medicine contains 475 mg of sucrose per tablet: this must be taken into consideration in the daily ration for patients on low-sugar diets or with diabetes.

IF YOU ARE IN ANY DOUBT, DO NOT HESITATE TO CONTACT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.