

Charbon Activé ival® 300 mg

Comprimé

Composition :

Charbon activé300 mg

Excipients : saccharose, carmellose sodique, povidone, stéarate de magnésium.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un adsorbant des toxines et des produits de fermentation, antiseptique gastrique et intestinal. Il est préconisé dans le traitement des manifestations fonctionnelles notamment avec météorisme et diarrhée.

Posologie et Mode d'administration :

Réserver à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

Avaler avec un peu d'eau, 1 à 2 comprimés par prise, après les repas ou au moment des crises.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Contre-indications :

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, le charbon activé est susceptible d'avoir des effets indésirables telles :

- la coloration noire des selles liée au charbon.
- survenue possible d'hypercalcémie, risque de lithiase rénale et d'insuffisance rénale liés au calcium en cas d'usage prolongé à fortes doses.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS LA NOTICE.

Précaution d'emploi :

Le charbon interagit avec certains autres médicaments absorbés par voie orale.

On constate une diminution de l'absorption digestive des médicaments administrés simultanément.

Par mesure de précaution, il convient de prendre le charbon à distance des autres médicaments.

Association nécessitant des précautions d'emploi :

- **Digitaliques :** prendre ce médicament à distance des digitaliques de plus de 2 heures.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

Grossesse : ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement : l'allaitement est possible lors d'un traitement par ce produit.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Présentation :

Boite de 40 comprimés.

D. E. n° : 07/10B172/195

ival
pharma

Fabriqué par Pharma Ival Z. I. Qued Tlelat, Oran.
www.ivalpharma.com