

# Loradine® 10 mg

(Loratadine)

Comprimé

## COMPOSITION ET PRÉSENTATION:

Loratadine ..... 10 mg

Excipients: Lactose monohydrate, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Excipient à effet notoire : Lactose.

Boîte de 20 comprimés.

## INDICATIONS:

Traitement symptomatique de la rhinite allergique et de l'urticaire chronique idiopathique.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Adulte et enfant de plus de 12 ans (> 30 kg) : 10 mg / jour soit 1 comprimé par jour.

Insuffisant hépatique sévère : 10 mg tous les deux jours.

Mode d'administration : Voie orale.

**Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.**

## CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité à la loratadine ou à l'un des excipients du médicament.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

## MISES EN GARDE:

-Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans (> 30 kg).

-En raison de la présence de lactose, ce produit n'est pas recommandé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

- Interrompre l'administration de loratadine au moins 48 heures avant de faire les tests cutanés pour le diagnostic de l'allergie.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

La loratadine doit être utilisée avec précaution chez l'insuffisant hépatique sévère.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ne pas utiliser ce produit en cas de grossesse ou d'allaitement.

**D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser un médicament.**

## INTERACTIONS :

**Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.**

## EFFETS INDÉSIRABLES:

Fréquents: Somnolence, céphalées, nervosité, augmentation de l'appétit, insomnie, fatigue.

Très rares: Anaphylaxie, vertiges, tachycardie, palpitations, nausées, bouche sèche, gastrite, troubles des fonctions hépatiques, rash, alopecie

## SURDOSAGE :

Symptômes : Somnolence, tachycardie et céphalées.

Traitement : Traitement symptomatique, lavage gastrique.

## CONSERVATION:

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

Conservé à une température inférieure à 30°C.

## Liste II.

## DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Avril 2015.

## D.E. Algérie:

13/98/01A 033/035

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur :

Pharmalliance

Domaine Kouchi Idir,

Ouled Fayet- Alger (Algérie)