أسـبيرين بيكر® 500

حمض أستيل ساليسيليك
قـــرص 500 مغ

1. الشكل و التقديم:
علبة ذات 28 قرص ابيض.

2.التركيب :
- يحتوي كل قرص على :
حمض اسيتيل ساليسيليك .....500 مغ.
-السواغات:
سيليلوز ميكروكريستالين، سيليس غرواني لامائي، لوريل سلفات صوديوم، حمض ستياريك، كروسكارميلوز صودي.

3.التصنيف الصيدلي العلاجي:
مضاد محيطي للألم، خافض للحرارة، ومضاد للالتهابات بجرعات عالية .

4. دواعي الاستعمال:
اسبـيرين بـيكر500 مغ موصف لعلاج الآلام الخفيفة إلى المعتدلة، و/أو حـالات الحمى.

5.مقدار الجرعة و طريقة الإستعمال:
عن طريق الفم.
خاص بالبالغ و الطفل الأكبر من 5 سنوات .
يأخذ الدواء مع كوب من الماء ومن المستحسن أثناء الوجبات الغذائية.
الجرعة اليومية القصوى هي حسب عمر المريض:
- الراشدين: 3 غ ، 6 مرات في اليوم.
-الأطفال:50مغ/كغ من 2 إلى 5 مرات في اليوم ،حسب النصائح الطبية.
- المسنين: 2غ / 4 مرات في اليوم.
يجب أن تكون الجرعات متباعدة على القل بـ 4 ساعات.

6. موانع الاستعمال:
لا يأخذ اسبيرين بيكر أبدا في الحالات التالية:
- حساسية معروفة لساليسيلي، و مضادات الالتهابات اللاأستيرويدية.
-القرحة المعدية العفجية المتطورة.
- جميع الأمراض النزيفية متكونة أو مكتسبة .
- خطر النزيف.
- مرض خطير في الكبد أو الكلى.
- المرأة الحامل ابتدءا من الشهر السادس بالنسبة للجرعات التي تفوق 500مغ /مرة في اليوم.
- تناول الاسبيرين لا يوصى بها عند المرأة المرضعة.
- ميتوتريكسات بجرعات مافوق 15مغ /الاسبوع.
- مضادات للتخثر الدم الفموية، لما اسبيرين بيكر تستعمل بجرعات عالية أو مساوية لـ3غ/اليوم.
في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي

7. تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال:
- تجنب أخذ اسبيرين بيكر في حالة الجدري(الأطفال)، حلقة تشبه الانفلونزا(الأطفال) و في حالة تعاطي كبير للكحول.
- اسبيرين بيكر ممنوعة في الحالات:النقرس،نزيف عدا الدورة الشهرية ونزيف غير عادي اثناء الدورة الشهرية.
- تاخذ اسبيرين بيكر باحتياط في الحالات:
- اصابة سابقة للقرحة المعوية أو المعي الاثني عشر، او نزيف معدي .
- الربو.
- استعمال المانع اللولبي.
- زيادة في المراقبة مطلوبة في حالة القصور الكلوي.
في حالة الشك، لا تترددوا في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

8.التداخلات الدوائية:
ابلغوا طبيبكم إذا كنتم تاخذون:
-مضادات لتخثر الدم عن طريق الفم، ميتوتركســـــــــات ،مضادات الالتهاب اللاستيرويدية(AINS)،هيبـارين، تيكلوبـيدين،ايريكوزوريك (بنزبـرامارون، بروبينسيد).
-مضادات السكري، غلوكوكورتيكويد، دواء مدر للبول، مضادات للضغط الدموي، انترفيرون الفا، بنتوكسيفيلين.
-ترومبوليتيك موضعي المعدي المعوي.
- استعمال المانع اللولبي.
لتفادي التفاعلات الممكنة بين عدة أدوية، ينبغي إعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء آخر قيد الاستعمال.

9. الحمل و الرضاعة:
الحمل :
-أثناء الأشهر الخمسة الأولى :يمكن للاسبيرين بيكر أن توصف في العلاج المنتظم. كتدبير وقائي، من المستحسن عدم استعمال الاسبيرين في علاج المزمن بجرعة تفوق 150مغ/اليوم.
-ابتداء من الشهر السادس:كل الأدوية ذات أساس الاسبيرين ممنوعة ابتداء من الشهر السادس.
الرضاعة :
-اسبيرين بيكر يمر عبر حليب الأم ،لذلك الرضاعة ممنوعة.
بصفة عامة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

10.الجرعة الزائدة:
في حالة علامات التسمم مع أعراض مرضية ،خاصة للأشخاص المسنين أو الأطفال الصغار ،استشيروا فورا الطبيب.

11. التأثيرات الجانبية :
ككل الأدوية، يمكن أن يؤدي اسبيرين بيكر 500 إلى تأثيرات مزعجة:
-دوي الأذنين، الشعور بالنقص في السمع، الصداع، والتي عادة ما تكون علامة من جرعة زائدة .
-القرحة المعدية. والنزيف معوي.
-نزيف في لثة الفم أو في الأنف قد يدوم 8أيام بعد توقف من أخذ الدواء.
-حوادث الحساسية.
-أوجاع البطن.
أعلموا الطبـــيب أو الصيدلي عن أي أثر غير مرغوب فيه أو مزعج غير مذكور في هذه النشرة.

12. الاحتياطات خاصة بالحفظ:
يحفظ في مكان جاف و في درجة حرارة اقل من 25درجة مئوية. لا يترك في متناول الأطفال.عدم تجاوز مدة الصلاحية المذكورة في العلبة.

دواء مرخص به تحت الرقم :10/03A001/447

الصانع / المعلب / المستثمر :
BEKER LABORATOIRES
مخابر بيكر، الجزائر
م.ن. إضافة للدار البيضاء 16100 الجزائر

تاريخ النشرة: نوفمبر 2010
ASP 500/N-01

ASPIRINE BEKER® 500 mg

ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE

Comprimé 500 mg

1- PRESENTATION
Boite de 28 comprimés blancs.

2-COMPOSITION
Chaque comprimé contient:
Acide acétylsalicylique.....500 mg.
Excipients :
Cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, laurylsulfate de sodium, acide stéarique, croscarmellose sodique.

3-CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Antalgique périphérique, antipyrétique, et anti –inflammatoire à dose élevée.

4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
ASPIRINE BEKER® 500 mg est indiqué dans le traitement des douleurs d'intensité légère à modérée et/ ou des états fébriles.

5-POSOLOGIE
Par voie orale.
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 5ans.
A avaler avec un verre d'eau de préférence au moment des repas.
La dose quotidienne maximale est fonction de l'âge du patient :
- Adultes : 3 g par jour en 6 prises
- Enfants : 50 mg/kg en 2 à 5 prises, selon avis médical
- Sujet âgé : 2 g par jour en 4 prises

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

6-CONTRE-INDICATIONS
Ne prenez jamais ASPIRINE BEKER® dans les cas suivants :
- allergie connue aux salicylés, et aux AINS.
- ulcère gastroduodénal en évolution.
- toute maladie hémorragique, constitutionnelle ou acquise,
- risque d'hémorragie.
- maladie grave du foie ou des reins.
- femme enceinte à partir du 6ème mois pour des doses supérieures à 500 mg/prise et par jour.
- la prise d'aspirine BEKER est déconseillée pour la femme allaitante.
- méthotrexate à des doses supérieur à 15 mg/semaine.
- anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine BEKER est utilisée à doses supérieur ou égale à 3 g par jour.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7-PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES
- Évitez la prise d'aspirine BEKER en cas de varicelle (enfants), épisodes d'allure grippale (enfants) et en cas de consommation importante d'alcool.
- Aspirine BEKER est déconseillée en cas de : goutte, métrorragies ou ménorragies.
- Aspirine BEKER doit être prise avec précautions en cas :
- D'antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, ou d'hémorragie digestive.
- Asthme.
- Port de stérilet.
- Surveillance accrue en cas d'altération de la fonction rénale s'impose.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8-INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS
Informez votre médecin si vous prenez :
- anticoagulants oraux, méthotrexate, autre AINS, héparine, ticlopidine, uricosuriques (benzbramarone, probénécide).
- antidiabétiques, glucocorticoide, diurétiques, antihypertenseurs, interféron alfa, pentoxifylline.
- thrombolytiques et topiques gastro intestinaux.
- port de stérilet.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse :
- Pendant les 5 premiers mois: l'aspirine BEKER en traitement ponctuel peut-être prescrite si besoin .Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser l'aspirine BEKER en traitement chronique au-delà de 150mg/jour.
- A partir de 6éme mois : tout médicament à base d'aspirine est contre indiquée à partir du 6éme mois.

Allaitement :
- L'aspirine BEKER passe dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé.

D'UNE FAÇON GENERAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT

10- SURDOSAGE
En cas de signes d'intoxication avec symptômes cliniques, particulièrement chez le sujet âgé et les jeunes enfants, consultez immédiatement un médecin.

11- EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Comme tous les médicaments, ASPIRINE BEKER® 500 est susceptible d'avoir des effets indésirables :
- bourdonnements d'oreilles, sensation de baisse de l'acuité auditive, céphalées ; qui sont habituellement la marque d'un surdosage.
- ulcère gastrique et hémorragies digestives,
- gingivorragie et épistaxis, pouvant persister jusqu'à 8 jours après l'arrêt du traitement,
- accidents de sensibilisation,
- douleurs abdominales,

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

12- CONDITIONS DE CONSERVATION
Conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à 25C°.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Médicament autorisé n° :10/03A 001/447

Fabricant / Conditionneur / Exploitant:
BEKER LABORATOIRES
Laboratoires Beker, Algérie
Zone d'Activité, extension Dar El Beida 16100, Alger.

ASP 500/N-01 Date de la notice: Novembre 2010