EXPANDOL®

Paracétamol 500mg Comprimés

COMPOSITION :

Paracétamol 500mg

Excipients : Amidon de mais, Stéarate de magnésium.

FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé sécable blanc, boite de 20 comprimés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES:

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué à partir de 15 ans chez l'adulte dans les maladies avec douleurs et fièvres telles que maux de têtes, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

CONTRE-INDICATIONS:

Allergies connues au paracétamol, maladie grave du foie.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Adulte : 1 à 2 comprimés par prise à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum sans dépasser 6 comprimés par jour.

Voie orale, comprimés à avaler avec une boisson (eau, lait, jus de fruit).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS DU MÉDICAMENT:

CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS AU MOINS GÊNANTS:

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.
- Exceptionnellement, un taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) peut se manifester par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Fabriqué par : **BIOGALENIC, Z.I. Zighoud Youcef - Constantine 25200 - Algérie**

Sous licence : **EXPANPHARM INTERNATIONAL, France**