Fucidine® 250 mg, comprimé pelliculé

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

◆ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

DENOMINATION
Fucidine® 250 mg, comprimé pelliculé.
Fusidate de sodium.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
Ce médicament, dont la substance active est le fusidate de sodium, est un antibiotique.

◆ DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est préconisé chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans dans le traitement d'infections dues à un germe, le staphylocoque, notamment dans leurs localisations cutanées, osseuses et articulaires.

◆ ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
L'acide fusidique ne diffusant pas dans le parenchyme rénal il ne s'élimine pas par l'urine; ainsi, sauf dans le cas où elle résulte d'une atteinte rénale, l'infection urinaire staphylococcique ne doit pas être traitée par ce produit.

La prise concomitante d'acide fusidique est contreindiquée avec les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine), utilisés dans le traitement des hypercholestérolémies, lorsque l'antibiotique est utilisé dans les infections cutanées (voir rubrique Interactions médicamenteuses et autres interactions).

MISES EN GARDE SPECIALES
La prise concomitante d'acide fusidique doit être évitée avec les inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine), utilisés dans le traitement des hypercholestérolémies, lorsque l'antibiotique est utilisé dans les infections ostéoarticulaires (voir rubrique Interactions médicamenteuses et autres interactions).
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Prévenez votre médecin en cas de maladie du foie.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 10 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Ce médicament est CONTRE-INDIQUE en association avec certains médicaments (atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine), utilisés dans le traitement des hypercholestérolémies, lorsque l'antibiotique est utilisé dans les infections cutanées (voir rubrique Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament ?).

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec certains médicaments (atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine) utilisés dans le traitement des hypercholestérolémies, lorsque l'antibiotique est utilisé dans les infections ostéoarticulaires, et ce, pendant et après le traitement.

En cas d'association avec la Ciclosporine, des dosages des concentrations sanguines de Ciclosporine et des contrôles de la fonction rénale sont recommandés pour une éventuelle adaptation posologique.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT
Grossesse
En raison du bénéfice thérapeutique élevé, l'utilisation de ce médicament peut être envisagée si besoin au cours de la grossesse, quel qu'en soit le terme.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement
Ce produit passe en petite quantité dans le lait maternel.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Information importantes concernant certains composants de Fucidine® 250 mg Comprimé pelliculé
Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament (voir aussi la rubrique « Mises en garde speciales »).

◆ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE
Adulte : 1 à 1,5 g en deux ou trois prises par jour en fonction de la gravité des infections Staphylococciques traitées.
Enfant de plus de 6 ans : 30 à 50 mg/kg/jour, en fonction de la gravité de l'infection staphylococcique traitée.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

◆ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, Fucidine® 250 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :
- possibilité d'allergie cutanée (exceptionnellement) ou de troubles digestifs (douleurs au niveau de l'estomac, vomissements, diarrhées),
- quantité excessive de bilirubine dans le sang, avec ou sans jaunisse, avec ou sans modification des enzymes du foie,
- manifestations hématologiques : diminution de la quantité de certains éléments du sang (globules rouges, granulocytes, plaquettes),
- manifestations musculo-squelettiques et systémiques : faiblesse musculaire et douleurs musculaires potentiellement graves (voir rubrique Interactions médicamenteuses et autres interactions).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

◆ EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES : sans objet.

◆ CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Vous pourriez avoir des troubles gastro-intestinaux, ou des effets sur le foie.
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

◆ CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Fucidine® après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP.
La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION
Pas de précautions particulières de conservation.

◆ COMPOSITION

La substance active est :
Fusidate de sodium (250 mg pour 1 comprimé pelliculé)
Les excipients sont :
Cellulose microcristalline, crospovidone, lactose monohydraté, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, talc, alpha-tocophérol, hypromellose, dioxyde de titane (E 171).... qsp un comprimé

Excipients à effet notoire :

Excipient	Quantité par comprimé
Lactose monohydraté	71,9 mg
Sodium	10 mg

FORME PHARMACEUTIQUE
Ce médicament se présente sous la forme de comprimés pelliculés.
Boîte de 10

Liste I – Uniquement sur ordonnance médicale

Détenteur de la Décision d'Enregistrement
Laboratoires LEO
2 rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France

Fabricant, Site de Fabrication et Conditionneur :
Laboratoires LEO
39, route de Chartres, BP 9- 28500 Vernouillet, France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Mai 2014.

Numéro de Décision d'Enregistrement: **99/13N 179/083**

◆ CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?
Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.
Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.
Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.
La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.
Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :
- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :
1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
2- Respectez strictement votre ordonnance.
3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

022915-04