Biopamox®

Amoxicilline trihydratée 1g
granules pour suspension buvable

COMPOSITION

Amoxicilline trihydratée.....1g
Excipients: Aspartam, Crospovidone, Arome menthe, Stéarate de Magnésium, Citrate de sodium, qsp 1 sachet dose
Excipients à effet notoire: Aspartame.....35mg

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Granules pour suspension buvable en sachets-dose à 1g, boite de 08.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antibiotique antibactérien de la famille des bêtalactamines du groupe des aminopénicillines (J: Anti-infectieux).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Les indications sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles: a l'amoxicilline
chez l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois: En traitement initial des: Pneumopathies aiguës, Surinfections de bronchites aiguës et exacerbations de bronchites chroniques, Infections ORL (otite, sinusite, angine documentée à streptocoque A bêta-hémolytique) et stomatologiques, Infections urinaires, Infections génitales masculines et infections gynécologiques, Infections digestives et biliaires, Maladie de Lyme : traitement de la phase primaire (érythème chronique migrant) et de la phase primosecondaire (érythème chronique migrant associé à des signes généraux: asthénie, céphalées, fièvre, arthralgies...), En traitement de relais de la voie injectable des endocardites, septicémies, En traitement prophylactique de l'endocardite bactérienne.
chez l'adulte uniquement: En association à un autre antibiotique (clarithromycine ou imidazolé) et à un antisécrétoire, en cas de maladie ulcéreuse gastroduodénale de l'adulte à Helicobacter pilori Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit jamais être utilisé:
- en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des bêtalactamines (pénicillines et céphalosporines) ou à l'un des excipients.
- Mononucléose infectieuse (risque accru de phénomènes cutanés).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé en association avec le méthotrexate.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de médecin ou de votre pharmacien

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- Associations déconseillées: Méthotrexate, augmentation des effets et de la toxicité hématologique du méthotrexate par diminution de son élimination.
- Associations à prendre en compte:
Allopurinol (et par extrapolation, autres inhibiteurs de l'uricosynthèse)
Risque accru de réactions cutanées.
- Interactions avec les anti-coagulants oraux (Acénocoumarol)
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacie

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La survenue de toute manifestation allergique, d'un érythème généralisé fébrile associé à des pustules, doit faire suspecter une pustulose exanthématique aiguë généralisée; elle impose l'arrêt du traitement et contre-indique toute nouvelle administration d'amoxicilline seule ou associée.

Comme avec toutes les bêta-lactamines, contrôler régulièrement la formule sanguine en cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline. En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine ou de la créatininémie. En cas d'administration de doses élevées d'amoxicilline, un apport hydrique suffisant doit être assuré, pour réduire les risques de cristallurie. Traitement de la maladie de Lyme : des réactions inflamatoires.
Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

UTILISATION ET CONDUITE DES MACHINES

Sans objet.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : l'amoxicilline peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.
Allaitement: l'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique. Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT

ADULTE: La posologie usuelle est de 1-1,5 ou 2 g/jour en 2 à 3 prises.
Mode d'administration: Voie orale. Ce médicament peut être pris pendant ou entre les repas. Verser le contenu du sachet-dose dans un demi-verre d'eau et boire immédiatement.
Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

SURDOSAGE

Les manifestations de surdosage peuvent être d'ordre neuropsychiques, rénales et gastro- intestinales. Le traitement en est symptomatique en surveillant particulièrement l'équilibre hydro- électrolytique. L'amoxicilline peut être éliminée par hémodialyse.

EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tout principe actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entrainer des effets plus ou moins gênants :
Manifestations allergiques: notamment urticaire, éosinophilie, œdème de Quink, gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique. Eruptions cutanées maculopapuleuse d'origine allergique ou non. Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, quelques cas de colite pseudomembraneuse. L'administration de fortes posologies de bêtalactamines, en particulier chez l'insuffisant rénal, peut entrainer des encéphalopathies (troubles de la conscience, mouvements anormaux, crises convulsives). Hépatite, néphrite, troubles des cellules sanguines.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité.
Tenir hors de la portée des enfants.
Liste I
Date de révision de la notice : Février 2016
N° de DE :

Fabricant, Conditionneur et Détenteur de la DE : les laboratoires BIOCARE.
RN 44 Sidi Kassi Ben M'Hidi, El Tarf Algérie.

BIOCARE LABORATOIRES