GLIMEPIRIDE BEKER®

Glimépiride

Comprimés sécables 1 mg, 2 mg, 3 mg et 4 mg

1-FORME ET PRESENTATION :

GLIMEPIRIDE BEKER® 1 mg : Comprimés sécables. Boite de 30 ou de 90 comprimés
GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg : Comprimés sécables. Boite de 30 ou de 90 comprimés.
GLIMEPIRIDE BEKER® 3 mg : Comprimés sécables. Boite de 30 ou de 90 comprimés.
GLIMEPIRIDE BEKER® 4 mg : Comprimés sécables. Boite de 30 ou de 90 comprimés.

2-COMPOSITION :

Chaque comprimé sécable contient :
GLIMEPIRIDE BEKER® 1 mg :
Glimépiride………………………….....1mg.
GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg :
Glimépiride…………………………....2mg.
GLIMEPIRIDE BEKER® 3 mg :
Glimépiride……………………………...3mg.
GLIMEPIRIDE BEKER ®4 mg :
Glimépiride……………………………...4mg.

Excipients : Lactose, cellulose microcristalline, glycoate d'amidon sodique, povidone, sulfate alkyl sodium, stéarate de magnésium

Colorants :
GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg : laque FD&C bleu # 1 et laque FD&C jaune #6 (jaune orangé -S).
GLIMEPIRIDE BEKER® 3 mg : oxyde de fer jaune.
GLIMEPIRIDE BEKER® 1 mg et 4mg : laque FD&C bleu # 1

Excipients à effet notoire :
GLIMEPIRIDE BEKER® 1 mg :
Lactose ……………………………………..……………59.97 mg/ Cp.
GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg :
Lactose…………………………………………………….72.06 mg/ Cp.
Jaune orangé –S (E110)…………………………………0.19 mg/ Cp.
GLIMEPIRIDE BEKER® 3 mg :
Lactose ………………………………………………….125.84 mg/ Cp
GLIMEPIRIDE BEKER® 4 mg :
Lactose ………………………………………………….124.15 mg/ Cp

3-CLASSE THERAPEUTIQUE :

GLIMEPIRIDE BEKER® est un antidiabétique oral appartenant à la famille des sulfonylurées. Il est utilisé dans le diabète sucré non insulinodépendant.

4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

GLIMEPIRIDE BEKER® est indiqué dans le traitement du diabète ne nécessitant pas d'insuline, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la réduction pondérale ne sont pas suffisants pour rétablir à eux seuls l'équilibre glycémique.

5-POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie
La posologie moyenne est de 1 à 4 mg/jour, la posologie maximale recommandée est de 6 mg / jour. Néanmoins votre médecin peut l'adapter à votre état.
Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de faire régulièrement des analyses de sang qui permettront à votre médecin de suivre les variations de glucose dans l'organisme et d'adapter ainsi votre traitement à leurs résultats.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

Mode d'administration :
Voie orale
Avalez les comprimés entiers avec environ un demi- verre d'eau, immédiatement avant le petit-déjeuner ou le premier repas principal.
La prise de **GLIMEPIRIDE BEKER®** doit toujours être suivie d'un repas
- La durée du traitement doit être déterminée par votre médecin.

6-CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
- Diabète nécessitant un traitement par l'insuline, en particulier diabète décompensé,
- Insuffisance rénale ou atteinte hépatique grave (défaillance grave du foie ou des reins) .
- Allergie connue au glimépiride ou à l'un des constituants de ce médicament, aux sulfamides et aux autres sulfonylurées.
- Grossesse et allaitement.
- Coma diabétique,
- Acidocétose,

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7- MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mise en garde :
Ce médicament est susceptible de provoquer des hypoglycémies (baisse du taux de sucre dans le sang) :
- En cas de sueurs, fringale (faim pressante), tremblements, accès de pâleur, troubles visuels, sensation de malaise, anomalies de comportement, absorber immédiatement du sucre ou un aliment sucré et prendre l'avis de votre médecin.

Le traitement par un sulfamide antidiabétique impose :
- Une régularité de l'alimentation.
- Une parfaite régularité de la prise du traitement.

L'association du glimépiride à des doses maximale de metformine se fera de la manière suivante :
- Tout en maintenant la posologie de la metformine, le glimépiride sera commencé à faibles doses, puis augmenté progressivement jusqu'à des doses maximales en fonction de l'équilibre métabolique recherché.

Toute prise de GLIMEPIRIDE BEKER ® doit être suivie de la prise d'un repas
Eviter l'alcool et les boissons alcoolisées.
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies métaboliques rares).
GLIMEPIRIDE BEKER ® 2 mg contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques
Précautions d'emploi :
-Suivre avec le plus de précision possible le régime prescrit par votre médecin.
-Effectuer régulièrement des contrôles biologiques comme prescrits ou conseillés par votre médecin.
-Avertir votre médecin dans les cas suivants :
  - Intervention chirurgicale, fièvre, infection, difficulté à s'alimenter.
  - Désir de grossesse.
  - Prise d'un autre médicament en particulier anti-inflammatoire, bêtabloquant, pilule contraceptive.

- Informer également le dentiste de votre traitement.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

8-INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN,

Votre médecin peut être amené à modifier la dose de **GLIMEPIRIDE BEKER ®** si vous prenez d'autres médicaments. L'effet de **GLIMEPIRIDE BEKER ®** (diminution du taux de sucre dans le sang) peut être augmenté par les médicaments suivants et entrainer un risque d'hypoglycémie :
· Insuline et antidiabétiques oraux, tels que la metformine
· Phénylbutazone, azopropazone, oxyphenbutazone,
. Aspirine, tritoqualine ;
· Certains sulfamides antibactériens à longue durée d'action, tétracyclines, chloramphénicol, fluconazole, miconazole, les quinolones, clarithromycine ;
· Antivitamines K tels que la warfarine;
· Stéroïdes anabolisants et hormones sexuelles mâles
· fibrates, fenfluramine ;
• Pentoxifylline (à forte dose par voie parentérale), inhibiteurs de l'enzyme de conversion, sympatholytiques,
. Allopurinol, probénécide, sulfinpyrazone ;
• Fluoxétine, IMAO;
· Cyclophosphamide, trophosphamides et iphosphamides;

L'effet de **GLIMEPIRIDE BEKER ®** peut être diminué par les médicaments suivants. Ceci peut entrainer un risque d'hyperglycémie (augmentation du taux de sucre dans le sang) :
· Oestrogènes, progestatifs,
· Adrénaline et sympathomimétiques
· Glucocorticoïdes, thyréomimétiques,
. Glucagon, barbituriques et rifampicine
. Chlorpromazine et autres dérivés de la phénothiazine,
· Laxatifs (usage à long terme) ;
. Acide nicotinique (forte posologie), diurétiques thiazidiques, acétazolamide
· Diazoxide, phénytoïne,

L'effet de diminution du taux de sucre dans le sang de **GLIMEPIRIDE BEKER®** peut être diminué ou augmenté par les médicaments anti-H2, les bêta-bloquants, la clonidine, la guanéthidine, la réserpine. Une attention particulière est nécessaire lorsque vous prenez ces médicaments car ils peuvent aussi masquer les signes d'hypoglycémie.
GLIMEPIRIDE BEKER ® peut augmenter ou diminuer les effets des antivitamines K de type dérivés coumariniques tels que la warfarine.

-La prise d'alcool peut augmenter ou diminuer le taux de sucre dans le sang, réduisant l'action de **GLIMEPIRIDE BEKER ®** de manière imprévisible.

9-GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :
Le traitement du diabète pendant la grossesse repose sur l'insuline. Prévenez votre médecin en cas de désir de grossesse.
Si vous êtes enceinte, avertissez votre médecin afin qu'il vous prescrive un traitement plus adapté.
Allaitement :
Le glimépiride peut passer dans le lait maternel, il ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

10- CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

Votre vision, votre vigilance et votre capacité de réaction lorsque vous conduisez ou utilisez des machines peuvent être diminuées, lorsque le traitement du diabète n'est pas équilibré ou en cas d'hypoglycémie.

11- EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, **GLIMEPIRIDE BEKER ®** est susceptible d'induire des effets indésirables :
Les effets indésirables rares :
- Diminution de certaines des cellules du sang : des globules blancs avec risque d'infection, des globules rouges pouvant donner pâleur et fatigue, des plaquettes avec risque de saignements.
- Manifestations hypoglycémiques (sueurs, pâleur, fringale, malaise).

Les effets indésirables très rares :
- Troubles digestifs (nausées, vomissements, lourdeurs d'estomac, diarrhée, douleurs abdominales).

En cas de fièvre ou d'angine, de pâleur, de fatigue, de bleus ou de saignements, avertir votre médecin.
- Atteinte de la fonction hépatique
- Diminution du taux de sodium dans le sang.

Les effets indésirables à fréquence indéterminées :
- Troubles transitoires de la vision.
- Anomalies biologiques du foie
- Eruption cutanée (démangeaisons, rougeurs) d'origine allergique ou provoquée par le soleil.
- Une allergie croisée avec les sulfonylurées, les sulfamides et leurs dérivés est possible.
- Infections du nez et de la gorge.
- Réactions allergiques en raison de la présence du jaune orangé-S pour le **GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg**.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

12- SURDOSAGE:

La prise d'une dose excessive se traduit par une hypoglycémie qui doit être traitée immédiatement par l'administration de sucre (4 à 6 morceaux). Si le patient est inconscient, avertir immédiatement un médecin et prévenir les secours d'urgence.

13-OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES :

Ne prenez jamais de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

14- CONSERVATION :

A conserver dans l'emballage externe d'origine, à une température ne dépassant pas 25° C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boite.
Liste I
D E n° :
GLIMEPIRIDE BEKER® 1 mg : **16/ 14A 187/447**
GLIMEPIRIDE BEKER® 2 mg : **13/14 A188/447**
GLIMEPIRIDE BEKER® 3 mg : **13/14 A189/447**
GLIMEPIRIDE BEKER® 4 mg : **13/14 A190/447**

Détenteur de la DE:
Laboratoires Beker
BEKER®
LABORATOIRES
Cité Aissat Idir, Dar el Beida 16100, Alger.
Fabricant/Conditionneur:
Laboratoires Beker - Algérie
Z.A, extension Dar El Beida, cité Fatma N'Soumer
N°18 Dar el Beida 16100, Alger.

Date de dernière mise à jour : **Avril 2015**

GLI 1 / N-03 et GLI 2 / N-03 et GLI 3 / N-03 et GLI 4 / N-03

غليميبيريد بيكر®

غليميبيريد

أقراص قابلة للقطع 1 مغ, 2 مغ ,3 مغ و 4 مغ

1-الشكل والتقديم

غليميبيريد بيكر® 1 مغ :أقراص قابلة للقطع . علبة ذات 30 او 90 قرص
غليميبيريد بيكر® 2 مغ :أقراص قابلة للقطع . علبة ذات 30 او 90 قرص
غليميبيريد بيكر® 3 مغ : أقراص قابلة للقطع . علبة ذات 30 او 90 قرص
غليميبيريد بيكر® 4 مغ: أقراص قابلة للقطع . علبة ذات 30 او 90 قرص

2-التركيب

يحتوي كل قرص قابل للقطع على:
غليميبيريد بيكر® 1 مغ :
غليميبيريد...1 مغ
غليميبيريد بيكر® 2 مغ :
غليميبيريد...2 مغ
غليميبيريد بيكر® 3 مغ :
غليميبيريد...3 مغ
غليميبيريد بيكر® 4 مغ :
غليميبيريد...4 مغ

السواغات:
لاكتوز.سيليلوز بلوري دقيق,غليكوات النشاء الصودي, بوفيدون,.سلفات ألكيل الصوديوم, . ستيبارات المغنيزيوم.
الملونات:
غليميبيريد بيكر® 2 مغ : لاك FD &C ازرق # 1. لاك FD &C أصفر#6 (أصفر برتقالي-S).
غليميبيريد بيكر® 3 مغ : أوكسيد الحديد الأصفر.
غليميبيريد بيكر® 1مغ و 4 مغ : لاك FD &C ازرق # 1 .

سواغات ذات اثر معلوم :
غليميبيريد بيكر® 1 مغ :
لاكتوز...59.97 مغ/للقرص
غليميبيريد بيكر® 2 مغ :
لاكتوز...72.06 مغ/للقرص
أصفر برتقالي -S(E110) .... 0.19 مغ/للقرص
غليميبيريد بيكر® 3 مغ :
لاكتوز...125.84 مغ/للقرص
غليميبيريد بيكر® 4 مغ :
لاكتوز...124.15 مغ/للقرص

3- الصنف العلاجي

غليميبيريد بيكر® عبارة عن مُضادٌ للسُكَّرِيّ عن طريق الفم ينتمي إلى عائلة السولفونيليوريا. يستعمل في حالة داء السكري غير المعتمد على الأنسولين.

4-دواعي الاستعمال

يوصف **غليميبيريد بيكر®** لعلاج داء السكري الذي لا يحتاج إلى الأنسولين, في حالة إذا ما كانت الحمية الغذائية ,ممارسة الرياضة و تخفيض الوزن غير كافيين لإعادة توازن السكر في الدم.

5- مقدار الجرعة و طريقة الاستعمال

مقدار الجرعة

مقدار الجرعة المتوسطة يتراوح بين 1 الى 4 مغ في اليوم , الجرعة القصوى التي ينصح بها هي 6 مغ في اليوم . مع ذلك يمكن للطبيب ضبطها حسب حالة كل مريض.
لاستعمال هذا الدواء بشكل جيّد, يجب القيام بتحاليل الدم بصفة منتظمة حتى يتمكن طبيبك من متابعة تغيرات الغلوكوز في الجسم و ضبط علاجك وفق نتائج التحاليل.
احترموا دائما مقدار الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب.

طريقة الاستعمال

عن طريق الفم
ابتلع الأقراص كاملة مع نصف كأس من الماء. مباشرة قبل وجبة الافطار او قبل أول وجبة رئيسية.
تناول **غليميبيريد بيكر®** يجب ان يكون دائما متبوعا بوجبة.
- مدة العلاج تحدّد من طرف الطبيب.

6 - موانع الاستعمال

يمنع استخدام هذا الدواء في الحالات التالية:
- داء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين, خاصة داء السكري لا معاوض.
-قصور كلوي او اصابة كبدية حادة (فشل شديد في الكبد او الكلى).
- حساسية معروفة اتجاه الغليميبيريد , احد الأسوغة التي تدخل في تركيبه او اتجاه السلفاميد و السولفونيليوريا.
- الحمل و الرضاعة.

في حالة الشك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

7 - تحذيرات خاصة واحتياطات الاستعمال

تحذيرات خاصة

من المحتمل ان يسبب هذا الدواء نَقْصُ سُكَّرِ الدَّم:
- في حالة التعرق, ألم خلو المعدة (الجوع المُلّح),الارتعاش, الشحوب اضطرابات في الرؤية, احساس بتوعك, سلوك غير عادي: يجب أخذ قطعة سكر او غذاء محلى في الحين و استشارة الطبيب.
العلاج بسلفاميد مُضادٌ للسُكَّرِيّ يستوجب:
- الانتظام في التغذية.
- الانضباط التّام في تناول الدواء.
إشراك **غليميبيريد بيكر®** مع جرعات قصوى من المتفورمين يتم كالتالي:
- الاحتفاظ بنفس جرعة المتفورمين و اخذ الغليميبيريد بجرعات ضئيلة في البداية ثم زيادتها تدريجيا حتى بلوغ الجرعات القصوى وفق التوازن الأيضي المطلوب.
تناول غليميبيريد بيكر® يتبع دائما بوجبة غذائية.
ينبغي تفادي الكحول و المشروبات الكحولية.
لا ينصح بتناول هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من حساسية للغلاكتوز, فقر في اللاكتاز او اعراض سوء امتصاص الغلوكوز او الغلاكتوز(أمراض أيضية نادرة).
يحتوي **غليميبيريد بيكر® 2 مغ** على صبغة عديمة الأحياء (E110) التي يمكن ان تسبب حساسية

احتياطات الاستعمال

- التقيد جيدا بالحمية الموصوفة من قبل الطبيب
-القيام بفحوص بيولوجية بشكل منتظم وفقا لنصائح وارشادات الطبيب.
-اعلم طبيبك في الحالات التالية:
- عملية جراحية, حمّى, عدوى, صعوبة في التغذية.
- رغبة في الحمل
- تناول دواء آخر و بالخصوص مضادات الالتهاب, موانع الفا ,حبوب منع الحمل.
- اعلم طبيب الاسنان بعلاجك.

في حالة الشك، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي

8 - التفاعلات مع أدوية أخرى

لتجنب التفاعلات المحتملة مع أدوية أخرى، يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي عن أي دواء آخر قيد الاستعمال.

قد يلجأ طبيبك لتغيير جرعة **غليميبيريد بيكر®** ان كنت تأخذ أدوية أخرى. مفعول **غليميبيريد بيكر®** (تخفيض كمية السكر في الدم) قد يزيد بالأدوية التالية ويؤدي الى خطر هبوط سكر الدم:
- الأنسولين و مُضادّاتُ السُكَّرِيّ عن طريق الفم, مثل المتفورمين.
- فينيل بوتازون , أزوبروبازون, أكْسِي فِينْبُوتازُون .
- أسبرين, تريتوكوالين.
- بعض السلفوناميدات المضادة للبكتيريا ذات فعل مطوّل, تتراسيكلين, كلورامْفينيكول, فليكونازول, ميكونازول , الكينولونات , كلاريترومِيسين.
مُضادُّات الفيتامين K مثل الوارفارين.
- ستيرويدات ابْتِنائية و هُرْمونات جِنْسِيَّة ذكرية.
- فيبرات, فينفلُورامين.
- بنتوكسيفيلين (بجرعات كبيرة عن طريق الحقن), مثبطات انزيم التحول داحِضُ الوُدِّي.
- ألُوبُورِينُول, بروبينيسيد, سَلفينبيرازون.
- فليوكسيتين, مثبطات أحادي الأمين أكسيداز .
- سِيكْلُوفُسْفاميد, تروفُسْفاميد و إفُسْفاميد.
مفعول **غليميبيريد بيكر®** قد ينقص مع الأدوية التالية, مما قد يسبب خطر فرط سكر الد م (ارتفاع نسبة السكر في الدم)
- إستَرُوجينات, بروجسترونيات.
- أدرينالين, مُحاكِيات الوُدِّيّة.
- قِشْرانِيّات سُكَّرِيّة, مُحاكِيات الهرمونات الدرقية.
- غلُوكاغُون ,بَارْبيتورِيّ و رِيفامبيسِين.
- كلُوربرُومازين و مشتقات أخرى للفينوتيازين.
- مُلَيِّنات (للاستعمال على المدى الطويل) .
- حمض نيكتونيكي (جرعة قوية), مدرات البول التيازيد ية , أسيتازولاميد.
- دَيازُوكسِيد ,فنيتوين .
مفعول **غليميبيريد بيكر®** المخفض لنسبة السكر في الدم قد ينقص او يزيد مع الادوية: مضادات الهيستامين 2 ,مثبطات بيتا , الكلونيدين, الغوانيتيدين, رِيزِيرْبين. من الضروري توخي الحذر عند اخد هذه الادوية لانها ايضا قد تخفي آثار هبوط سكر الدم.
غليميبيريد بيكر® قد ينقص او يزيد مفعول مضادات الفيتامين K من نوع المشتقات الكومارينية مثل الورفارين.
- تناول الكحول قد يزيد او ينقص نسبة السكر في الدم, منقصا بذلك مفعول **غليميبيريد بيكر®** بصفة غير متوقعة.

9-الحمل والرضاعة

الحمل

علاج داء السُكَّرِيّ خلال فترة الحمل يكون بالانسولين. اعلمي طبيبك في حالة رغبة في الحمل.
ان كنت حامل. عليك بإعلام الطبيب حتى يصف لك الدواء الأنسب.

الرضاعة:

الغليميبيريد يتسرب في حليب الام. لذا يمنع العلاج بهذا الدواء خلال فترة الارضاع

بصفة عامة، ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا دواء أثناء الحمل و الرضاعة

10 - السائقين ومستعملي الالات

رؤيتك, انتباهك وردود افعالك قد تنقص أثناء القيادة واستخدام الآلات ان كان علاج السكري غير متوازن او في حالة نقص السكر في الدم.

11 - الآثار غيرالمرغوبة

مثل كل الادوية ؛**غليميبيريد بيكر®** من المحتمل ان تكون له آثار غيرمرغوبة:

الآثار غير المرغوبة النادرة

- نقص بعض خلايا الدم: الكريات البيضاء مع خطر العدوى, الكريات الحمراء التي قد تسبب الشحوب و التعب, الصفائح مع خطر النزيف
-اعراض نقص السكر في الدم (التعرق, الشحوب , ألم خلو المعدة , الشحوب , التوعك).

الآثار غير المرغوبة النادرة جدا

- اضطرابات هضمية (غثيان ,قيء, ثقل المعدة ,اسهال, آلام في البطن).
في حالة الحمّى او الَتهاب الحلق ؛ الشحوب , التعب ؛ كدمات او نزيف اعلم طبيبك.
- اختلال الوظيفة الكبدية.
- نقص نسبة الصوديوم في الدم.

الآثار غير المرغوبة غير محددة التكرار

- اضطرابات انتقالية في الرؤية.
- تشوهات بيولوجية للكبد
- طفح جلدي,(حكة؛ احمرار) الناتجة عن حساسية او اشعة الشمس.
- حساسية مشتركة محتملة مع السولفونيلوريا و السولفاميد و مشتقاتهم.
-عدوى الانف و الحنجرة
ردود فعل حساسية **للغليميبيريد بيكر® 2 مغ** نظرا لاحتوائه على صبغة عديمة الأحياء أصفر برتقالي-S

أعلموا الطبيب أو الصيدلي عن أي اثر غير مرغوب فيه او مزعج غير مذكور في هذه النشرة

12 - الجرعة الزائدة:

تجاوز الجرعة يؤدي الى هبوط السكر في الدم الذي يجب معالجته ورا بتناول السكر (4 الى 6 قطع). اذا كان المريض فاقدا الوعي ؛ يجب اعلام الطبيب فورا و استدعاء الإغاثة بسرعة.

13 – نسيان جرعة او عدة جرعات :

لا يجوز مضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المنسية.

14 - الحفظ:

يحفظ داخل العلبة الخارجية الأصلية في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م .
لا يترك في متناول الأطفال.
لا يستعمل بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العلبة

القائمة I.
مقرر التسجيل رقم:
غليميبيريد بيكر® 1 مغ : 16/14A187/447
غليميبيريد بيكر® 2 مغ : 13/14A188/447
غليميبيريد بيكر® 3 مغ : 13/14A189/447
غليميبيريد بيكر® 4 مغ : 13/14A190/447

صاحب مقرر التسجيل:
مخابر بيكر
BEKER®
LABORATOIRES
حي عيسات إيدير, الدار البيضاء 16100, الجزائر.
الصانع/المعبئ:
مخابر بيكر - الجزائر
م.ن. إضافة للدار البيضاء, حي فاطمة نسومر
رقم 18 الدار البيضاء 16100, الجزائر.

تاريخ مراجعة النّشرة : أفريل 2015