Kétoderm® 2%, gel en sachet-dose

kétoconazole

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement et votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

Kétoconazole..... 120,00 mg

pour un sachet-dose

Excipients : laurylèthersulfate de sodium, monolauryléthersulfosuccinate disodique, diéthanolamide d'acide gras de Coprah, chlorure d'hydroxypropyl lauryl diméthyl ammonium, dioléate de macrogol 120 méthylglucose, acide chlorhydrique concentré, imidurée, parfum Bouquet DL 19372 (dont propylèneglycol), érythrosine (E 127), hydroxyde de sodium, chlorure de sodium, eau purifiée.

FORME PHARMACEUTIQUE

Gel en sachet-dose de 6 g, boîte de 8

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFONGIQUE LOCAL
(D : Dermatologie)

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

JANSSEN-CILAG
1, rue Camille Desmoulins
TSA 91003
92787 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

JANSSEN PHARMACEUTICA NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse - Belgique

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un gel moussant antifongique pour application locale.
Ce médicament est destiné à traiter la dermite séborrhéique de l'adulte.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- allergie connue à l'un des constituants du produit.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant les 3 premiers mois de la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter le contact avec les yeux.
En cas de contact accidentel avec l'œil, rincer à l'eau.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE-ALLAITEMENT

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin pendant les 3 premiers mois de la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Propylèneglycol.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE

Habituellement, 2 applications par semaine le premier mois de traitement.
Un traitement d'entretien peut être jugé nécessaire par le médecin, il est habituellement d'une application par semaine ou par quinzaine selon les résultats obtenus.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie cutanée
Bien mouiller les zones atteintes, peau et/ou cuir chevelu.
Appliquez le gel, faites mousser abondamment. Eviter le contact avec les yeux.
Laisser en place 5 minutes. Pour une bonne efficacité, il est important de respecter cette durée minimum.
Rincez ensuite soigneusement
Ne pas avaler.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas d'ingestion accidentelle de KETODERM 2 %, gel en sachet-dose, consultez immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : possibilité de rares cas de brûlure locale, de sensation de sécheresse de la peau, de démangeaisons. Dans de rares cas, principalement chez les patients ayant des cheveux gris ou des cheveux traités fréquemment (permanente, teinture, etc...), une chute de cheveux, une modification de leur texture (cheveux gras/secs, cassants) ou de leur couleur peuvent apparaître.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION:
A conserver à une température ne dépassant pas +25° C.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

Liste I - DE D-095-07D092-98

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :
03/05/2008

JANSSEN-CILAG