NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MYCOSTER® 1% crème pour application cutanée

Ciclopiroxolamine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER® 1%, crème ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER® 1%, crème ?
3. COMMENT UTILISER MYCOSTER® 1%, crème?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYCOSTER® 1%, crème?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE MYCOSTER® 1%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIFONGIQUE A USAGE TOPIQUE

Ce médicament est préconisé dans le traitement:
- des mycoses de la peau ou des ongles (affections dues aux champignons) surinfectées ou non par des bactéries,
- dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOSTER® 1%, crème?

N'utilisez jamais MYCOSTER® 1%, crème dans les cas suivants:
- en cas d'allergie à l'un des composants du produit,
- prévenir votre médecin en cas de grossesse,
- ne pas appliquer ce médicament près des yeux,
- ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec MYCOSTER® 1%, crème:

Précaution d'emploi

Ne pas appliquer ce médicament près de la région oculaire.
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorable à la multiplication de candida).
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de MYCOSTER® 1%, crème

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et de l'acool stéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines: sans objet.

3. COMMENT UTILISER MYCOSTER® 1%, crème?

Posologie

Si vous avez l'impression que l'effet de MYCOSTER® 1%, crème est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Voie cutanée, réservé à l'usage externe.