Locapred 0,1%

Désonide 0,1%

1 - IDENTIFICATION DU MEDICAMENT. Dénomination : LOCAPRED 0,1 POUR CENT, crème. **Composition qualitative et quantitative :** Désonide 0,10 g. Excipients : stéarate de polyoxyéthylène glycol 600 (mono et diesters), stéarate de polyoxyéthylène glycol 300, paraffine liquide légère, glycérides polyglycosylés saturés, alcool cétylique, propyleneglycol, parahydroxybenzoate de méthyle, acide sorbique, gallate de propyle, eau purifiée. Pour 100 g de crème. **Forme pharmaceutique :** Crème, tubes de 10 g, 15 g, 20 g et de 30 g. **Classe pharmaco-thérapeutique :** DERMOCORTICOIDE (Dermatologie).
Nom et adresse de l'exploitant : Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie. PIERRE FABRE MEDICAMENT. 45, place Abel-Gance, 92100 Boulogne - France. **Nom et adresse du fabricant :** PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION. Etablissement Progipharm. Rue du Lycée, 45500 Gien - France.
2 - DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications thérapeutiques) : Ce médicament est un corticoïde local d'activité modérée. Il est préconisé dans certaines maladies de peau comme l'eczéma de contact, la dermatite atopique, mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.
3 - ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (Contre-indications) : Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : - allergie à l'un des composants du médicament - lésions ulcérées - acné - rosacée - maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle...), bactérienne (exemple : impétigo...), mycosique (dues à des champignons microscopiques) ou parasitaire - application sur les paupières. EN CAS DE DOUTE,IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Précautions d'emploi :** Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils du médecin : - ne pas appliquer sur le visage sauf en cas de prescription formelle de votre médecin - éviter les applications sur une grande surface, sous un pansement occlusif en raison de la possibilité de passage d'une partie du principe actif dans le sang - éviter l'application prolongée, sur le visage, dans les plis - toute irritation ou infection doit être signalée à votre médecin - si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté. EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. **Interactions médicamenteuses et autres interactions :** AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. **Grossesse - Allaitement :** En cas de grossesse ou d'allaitement, prévenir votre médecin. **Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :** - prolyleneglycol - parahydroxybenzoate de méthyle.
4 - COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT. Posologie : La posologie est de 1 à 2 applications par jour en couche mince, suivies d'un léger massage. Ne pas augmenter le nombre d'applications par jour. **Mode et voie d'administration :** VOIE CUTANEE. Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, puis de l'étaler en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé. Se laver les mains après l'application. **Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré :** 1 à 2 applications par jour selon l'ordonnance de votre médecin. **Durée du traitement :** L'arrêt du traitement se fera de façon progressive, en espaçant les applications et/ou en utilisant un corticoïde moins fort ou moins dosé. Respecter strictement l'ordonnance de votre médecin et ne pas prolonger le traitement.
5 - EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (Effets indésirables) : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : En cas d'utilisation prolongée, il y a risque d'amincissement et de fragilité de la peau, dilatation de petits vaisseaux sanguins, vergetures, poussée d'acné. Des cas d'hypertrichose, de dépigmentation, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
6 - CONSERVATION : Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur. Médicament autorisé en France n° 319 279-6. Liste I médicament uniquement sur ordonnance, non renouvelable sans avis médical. A conserver à une température inférieure à 30 °C.