Efficort

aceponate d'hydrocortisone 0,127%

CREME LIPOPHILE

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème
- La substance active est : Acéponate d'hydrocortisone 0,127g
- Les autres composants sont : vaseline blanche, bi-tristéarate d'aluminium, paraffine liquide, protegin WX, dub BW, sulfate de magnésium, eau purifiée ..... q.s.p. 100g

Titulaire-Exploitant :
Galderma International
Tour Europlaza – La Défense 4
20 avenue André Prothin
92927 LA DEFENSE CEDEX

Fabricant :
Laboratoires GALDERMA
Zone Industrielle - Montdésir
74540 ALBY SUR CHERAN

1. QU'EST-CE QUE EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une crème contenant de l'acéponate d'hydrocortisone.
Ce médicament est un dermocorticoïde d'activité forte.
Il est indiqué dans certaines maladies comme l'eczéma, le psoriasis, les allergies cutanées.
Mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.

2. INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent.

Ne pas utiliser EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème dans les cas suivants :
- Allergie à l'un des composants du médicament,
- Lésions ulcérées,
- Acné et rosacée,
- Maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle), bactérienne (exemple : impétigo...), mycosique (dues à des champignons microscopiques) et parasitaire,
- Application sur les paupières.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prendre des précautions particulières avec EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- Une partie du principe actif peut traverser la peau et passer dans le sang en particulier lorsque la crème est appliquée sur une grande surface, sous un pansement ou une couche imperméable chez les enfants et les nourrissons.
- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis de votre médecin.
- En raison de la présence d'huile de ricin, risque d'allergie, notamment chez l'enfant de moins de 3 ans.

Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils du médecin :
- Localisation exacte des applications.
- Ne l'utiliser chez le nourrisson que sur indication explicite du médecin.
- Un traitement chez l'enfant de moins de 12 ans doit être soumis à une stricte surveillance médicale.

Les recommandations suivantes doivent être suivies :
- Soins d'hygiène : ne pas utiliser simultanément un antiseptique à pH alcalin.
- Eviter l'application prolongée, sur les paupières, le visage, dans les plis.
- Toute irritation ou infection doit être signalée au médecin.
- Si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté.

Liste des excipients à effet notoire
- Huile de ricin

Grossesse – Allaitement
En cas de grossesse ou d'allaitement, prévenir votre médecin.
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT UTILISER EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème ?

Médicament à usage local : voie cutanée.

La posologie est en moyenne de 1 à 2 applications par jour en couches minces, suivies d'un léger massage.
- Ne pas augmenter le nombre d'applications par jour.
- Si aucune amélioration n'est constatée en fin de traitement, consulter votre médecin.
- Se laver les mains après l'application.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

*Si vous avez l'impression que l'effet de **EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

*Si vous avez utilisé plus de **EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème** que vous n'auriez dû : consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

*Si vous oubliez d'utiliser **EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème :** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.*

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- En cas d'utilisation prolongée : amincissement et fragilité de la peau, perte de coloration de la peau, dilatation des petits vaisseaux sanguins, vergetures, poussée d'acné, rougeurs et irritation autour de la bouche.
- Risque d'eczéma.
- Des cas de développement exagéré du système pileux, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement sous pansement occlusif ou dans les plis ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER EFFICORT Lipophile 0,127 pour cent, crème ?

A conserver à température ambiante.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Liste I

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2004.

Médicament enregistré 01/07H117/123

Pays d'origine : France