

### Composition :

Chaque 100 g de crème contient 2 g d'acide fusidique et du valérate de bétaméthasone équivalent à 0,1 g de bétaméthasone.

Excipients : Propylène glycol, céto macrogol, huile minérale, alcool céto stéarylique, paraffine, sorbate de potassium, phosphate de sodium monobasique, acide orthophosphorique et eau purifiée.

Excipients à effet notoire : Propylène glycol, alcool céto stéarylique.

### Propriétés Pharmacologiques :

Zeta-Cort<sup>®</sup> est une association de l'effet antibactérien local puissant de l'acide fusidique et des effets anti-inflammatoires et antiprurigineux de la bétaméthasone.

L'acide fusidique est un antibiotique obtenu à partir de *Fusidium coccineum* ; il est efficace contre les staphylocoques, les streptocoques, les corynébactéries, les *Neisseria* et certaines *Clostridia* et *Bacteroides*.

L'activité antibactérienne de l'acide fusidique est due à l'inhibition de la synthèse des protéines bactériennes.

La bétaméthasone est un stéroïde à application locale doté d'un effet rapide sur les dermatoses inflammatoires.

### Indications :

Zeta-Cort<sup>®</sup> est indiqué dans le traitement des dermatoses inflammatoires associées à une infection, notamment :

L'eczéma constitutionnel, l'eczéma discoïde, l'eczéma de stase, la dermatite séborrhéique, l'eczéma de contact, la névrodermie circonscrite, le psoriasis, le lupus érythémateux discoïde.

### Contre-indications :

Zeta-Cort<sup>®</sup> est contre-indiqué pour les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un de ses composants.

Les corticostéroïdes à application locale sont contre-indiqués dans les affections suivantes :

- infections virales, tuberculeuses et fongiques de la peau ;
- dermatite péri-orale ;
- acné rosacée et affection ulcéraive.

### Précautions d'emploi :

Il est recommandé de retirer ses lentilles de contact lors de toute infection oculaire.

Chez le nourrisson, il est préférable d'éviter les corticoïdes d'activité modérée.

### Mises en garde :

Éviter les traitements continus de longue durée, en particulier sur le visage, dans les zones de courbure et intertrigineuses, ainsi que chez le nourrisson et l'enfant.

En raison de la présence de l'alcool céto stéarylique, ce médicament peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations cutanées.

### Grossesse et allaitement :

- Grossesse :

Il est préférable d'éviter l'application de Zeta-Cort durant la grossesse.

- Allaitement :

Durant la période d'allaitement, l'emploi de Zeta-Cort devrait être limité,

aussi bien en ce qui concerne la surface traitée que la durée. Dans tous les cas, demandez l'avis de votre médecin.

### Posologie et mode d'administration :

Lésions découvertes : Appliquer 1 à 2 fois par jour.

Lésions couvertes (sous bandage) : une seule application par jour est suffisante.

### Surdosage :

Aucune forme de surdosage n'a été déclarée.

### Effets indésirables :

Avec les autres corticostéroïdes à application locale, un traitement prolongé et intensif peut provoquer des changements atrophiques de la peau. Des réactions d'hypersensibilité ont été signalées dans de rares cas. Consultez votre pharmacien ou votre médecin si vous observez un quelconque effet indésirable.

### Conditions de conservation et de stockage :

A conserver à température comprise entre (15 - 30) °C.

Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le produit présente des signes visibles de détérioration.

### Présentations :

Zeta-Cort<sup>®</sup> crème : Tube de 15g.

Usage externe uniquement.

Ne pas avaler.

Liste I

Date de révision de la notice : 04/2011

Déno d'enregistrement N° : Zeta-Cort<sup>®</sup> crème : 09/07H169/352

Zeta-Cort<sup>®</sup> est une marque déposée

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

### Fabricant :

EL KENDI Industrie du Médicament

Siège : Haouch Kaouche N°2, villa N° 14, Dely Brahim - Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda - Alger.