COLOSTOP® 200 mg

Trimébutine

COMPOSITON QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
Trimébutine maléate ……..... 200 mg.
Excipients: hypromellose, stéarate de magnésium, croscarmellose, q.s.p...1comprimé
Excipients à effet notoire: lactose.

FORME PHARMACETIQUE ET PRESENTATION :
Boite de 30 comprimés.

CLASS PHARMACO-THERAPEUTIQUE :
Antispasmodique musculotrope
(A : appareil digestif et métabolisme).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT :
Ce médicament est indiqué dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires. Il corrige les troubles du transit associés.

ATTENTION !
DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :
Hypersensibilité connue à la Trimébutine et / ou à l'un des autres composants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :
En raison de la présence du lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien

INTERACTIONS MEDICAMENEUSE ET AUTRES INTERACTIONS :
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement pris en cours, à votre médecin ou à votre pharmacien

GROSSESSE- ALLAITEMENT :
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,consulter votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. L'allaitement est possible lors d'un traitement par ce médicament.
D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacie avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :
Réservé à l'adulte.
La posologie usuelle est de 300 mg par jour, soit 1 comprimé à 100 mg 3 fois par jour.
Exceptionnellement, la posologie peut être augmentée jusqu'à 600 mg par jour, soit 1 comprimé à 200 mg 3 fois par jour, ou 6 comprimé à 100 mg par jour
Le traitement par le comprimé à 200 mg doit être de courte durée.

MODE ET VOIE D'ADMNISTRATION :
Vois orale.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau au cours ou à la fin des repas.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :
En cas de surdosage, arrêtez rapidement votre traitement et avisez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :
Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes, entrainer des effets plus ou moins gênants: rares réactions cutanées. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSEVATION :
- A conserver à une température ne dépassant pas 30° c.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur la boite.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

LISTE II

Fabricant /Conditionneur/ Détenteur de la D.E :
PHYSIOPHARM Laboratoires
32 A, Zone industrielle le Rhumel
Constantine-Algérie.

DERNIERE MIS A JOUR : Février 2017
D.E : 17/10F 193 /462

PHYSIOPHARM® LABORATOIRES

كولـوستـوب® 200 مغ

تريميبوتين

التركيبة الكمية و النوعية :
تريميبوتين ماليات .....200 مغ
السواغات :
ايبروميلوز، كروسكارميلوز، ستيارات المغنيزيوم
ك.ك.ل.....1 قرص
السواغات ذات تأثير بين : لاكتوز

الشكل الصيدلي و التقديم : علبة من 30 قرصا.

الفئة الصيدلانية العلاجية :
مضاد للتشنجات العضلية : (الجهاز الهضمي و الاستقلاب).

حالات إستعمال هذا الدواء :
ينصح باستعمال هذا الدواء في حالات الشعور بالآلام الناتجة عن الأمراض الهضمية أو الصفراوية عند الشخص البالغ , فهو يعالج اضطرابات العبور المشتركة

حـذار!
متى يمنع استعمال هذا الدواء:
حساسية ضد التريميبوتين و أو أحد السواغات الأخرى.

احتياطات الاستعمال :
إن هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز, لذا لا يمكن استعماله في حالة الغلوكتوزمية (وجود غير طبيعي للغالكتوز في الدم) متلازمة امتصاص الغلوكوز و الغالكتوز أو نقص في مادة لكتاز (أمراض استقلاب نادرة
, في حالة الشك
لاتترددوا في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التفاعلات مع الأدوية و التفاعلات الأخرى:
لتفادي إحتمالات التفاعلات بين عدة أدوية, يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي دون تردد بكل دواء تتناولونه

الحمل و الرضاعة :
لا يستعمل هذا الدواء خلال فترة الحمل إلا باستشارة الطبيب و إذا اكتشفتي الحمل خلال فترة العلاج, فاستشيري طبيبك, لأنه الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ضرورة مواصلة العلاج.
يمكن الإرضاع خلال فترة العلاج بهذا الدواء
و بصفة عامة, يفضل خلال فترة الحمل أو الرضاعة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء

كيف يؤخذ هذا الدواء :
مخصص للبالغين :
الجرعة المعتادة هي 300 مغ يوميا أي قرص واحد من 100 مغ ثلاث مرات في اليوم بشكل استثنائي , يمكن زيادة الجرعة إلى 600 مغ يوميا أي قرص واحد من 200 مغ ثلاث مرات يوميا, أو 6 أقراص 100 مغ يوميا
يجب أن يكون العلاج بأقراص 200 مغ لمدة قصيرة.

طريقة ونمط التناول :
عن طريق الفم, يجب ابتلاع الأقراص بتناول كوب من الماء أثناء أو عند إكمال الوجبة

ما العمل في حالة زيادة الجرعة :
في حالة زيادة الجرعة , اتصلوا بالطبيب.

الآثار غير المرغوبة و المزعجة :
مثل جميع المواد الفعالة, فان هذا الدواء يمكن أن ينتج عند بعض الأشخاص, آثارا مزعجة
تفاعلات جلدية نادرة
ابلغوا الطبيب أو الصيدلي بكل تأثير مزعج أو غير مرغوب فيه, لم يتم الإشارة إليه في هذه النشرة

الحفظ :
يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30°م .
عدم تجاوز تاريخ آخر اجل للاستعمال المشار إليه على العلبة
لا يترك في متناول الأطفال

القائمة II

الصانع / المعبئ / صاحب مقرر التسجيل:
مخابر فيزيوفارم
المنطقة الصناعية الرمال , قسنطينة - الجزائر A 32

آخر التعديلات: فيفري 2017
مقرر التسجيل : 462/ 17/10F 193

PHYSIOPHARM®
LABORATOIRES