LOPERAMIDE NS®
Chlorhydrate de lopéramide
Gélule 2 mg

COMPOSITION:
Substance active: Chlorhydrate de lopéramide..….....…...2mg
Quantité correspondant à lopéramide base...1,86 mg
Excipients: Lactose monohydraté, amidon de riz, talc, stéarate de magnésium, gélule n°3 gris/ vert foncé. Enveloppe de la gélule: gélatine, oxyde de fer noir, jaune orange, bleu patenté, dioxyde de titane.
EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:
Lactose (127mg/gélule).
Jaune orangé (0.0999%).
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION:
Boîte de 20 gélules.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:
Anti-diarrhéique.
INDICATIONS:
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des diarrhées aiguës et chroniques.
Le traitement ne dispense pas de mesures diététiques et d'une réhydratation si elle est nécessaire.
MODE D'ADMINISTRATION/ POSOLOGIE:
Voie orale.
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 8 ans.
- Diarrhée aiguë:
Adulte: La posologie initiale est de 2 gélules.
Après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire sera administrée, sans dépasser 8 gélules par jour.
Enfant de plus de 8 ans: La posologie initiale est de 1 gélule.
Après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire sera administrée, sans dépasser 6 gélules par jour.
- Diarrhée chronique:
1 à 3 gélules par jour chez l'adulte.
1 à 2 gélules par jour chez l'enfant.
CONTRE INDICATIONS:
Ne prenez jamais LOPERAMIDE NS 2 mg, gélule:
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au lopéramide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- En cas de sang dans les selles et/ou de fièvre importante,
- En cas de maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique.
- Chez l'enfant de moins de 8 ans.
- Chez les patients souffrant d'entérocolite bactérienne.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:
Mises en garde:
Consulter votre médecin si vous avez constaté une absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement.
Précautions d'emploi:
- Le lopéramide ne doit pas être utilisé en cas de diarrhées survenant au cours d'un traitement antibiotique (risque de colite pseudo-membraneuse).
- Ce médicament ne doit pas être utilisé lorsqu'une inhibition du transit intestinal doit être évitée.
- L'administration de ce médicament doit être interrompue en cas de constipation ou de distension abdominale.
- En cas d'insuffisance hépatique, prévenir votre médecin; une surveillance médicale étroite peut s'avérer nécessaire en cas de traitement par ce médicament.
- Le lopéramide ne doit pas être utilisé comme traitement de première intention dans les dysenteries aiguës avec présence de sang dans les selles et fièvre importante.
- Ce traitement est un complément des règles diététiques:
• se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée,
• s'alimenter le temps de la diarrhée, en excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés. Et en privilégiant les viandes grillées, le riz.
- Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
GROSSESSE ET ALLAITEMENT:
Grossesse:
L'utilisation du lopéramide ne doit être envisagée au cours de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Allaitement:
L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.
EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES:
Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges. L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de certaines machines, sur les risques éventuels attachés à l'emploi de ce médicament.
EFFETS INDESIRABLES:
Les effets indésirables les plus fréquents sont les nausées, la constipation et les crampes abdominales.
Les effets indésirables suivants ont également été rapportés:
- Rash, urticaire, prurit.
- Réactions allergiques pouvant inclure des difficultés respiratoires ou pour avaler, un gonflement du visage (œdème de Quincke), choc anaphylactique…
Douleur abdominale, ileus, distension abdominale, vomissement, mégacôlon incluant le syndrome colectasique, flatulence, dyspepsie, sécheresse buccale.
- Difficulté à uriner.
- Somnolence, vertiges, perte ou diminution de la conscience.
- Fatigue.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.
SURDOSAGE:
En cas de surdosage, une dépression du système nerveux central (diminution de la vigilance, somnolence, rétrécissement de la pupille, difficulté à respirer, difficulté à coordonner ses mouvements...) et un iléus (obstruction intestinale) peuvent survenir.
Dans ce cas, il faut administrer un antidote (la naloxone). Une surveillance hospitalière doit être maintenue pendant au moins 48 heures.
CONDITIONS DE CONSERVATION:
- A conserver à une température inférieure à 25° C.
- Tenir hors de la portée des enfants.
LISTE: II
DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE: Mars 2017
DE N°: 17/10H056/318
Fabricant, conditionneur et détenteur de la DE:
Laboratoires PHARMIDAL NS
144, Z.I le RHUMEL
25000 Constantine - ALGERIE
Tél: (+213) 031661201/ Fax: (+213) 031669471

Pharmidal n.s