

Donépézil chlorhydrate, comprimés oro-dispersibles à 5 mg / voie orale.
Donépézil chlorhydrate, comprimés oro-dispersibles à 10 mg / voie orale.

1. QU'EST-CE QUE KYNCEPT® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? Qu'est-ce que KYNCEPT® ?

KYNCEPT® appartient à une classe de médicaments appelés « inhibiteurs de l'acétylcholinestérase ». Le donépézil augmente les concentrations dans le cerveau d'une substance (acétylcholine) qui participe dans le processus de la mémoire en diminuant la destruction de l'acétylcholine.

Dans quel cas KYNCEPT® est-il utilisé ?

KYNCEPT® Ce médicament est utilisé pour le traitement symptomatique des formes légères à modérément sévères de la maladie d'Alzheimer. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer incluent une perte progressive de la mémoire, une confusion et des modifications du comportement. Il devient de ce fait de plus en plus difficile de réaliser les activités de la vie quotidienne. KYNCEPT® est utilisé uniquement chez l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE KYNCEPT® ?

Contre-indications :

Ne prenez jamais KYNCEPT® :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au donépézil ou aux dérivés de la pipéridine ou à l'un des autres composants du médicament.

• En raison de la présence d'aspartame, ce médicament est contre-indiqué en cas de phénylcétonurie. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi; mises en garde spéciales :

Faites attention avec KYNCEPT® :

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien avant de commencer à prendre KYNCEPT® si vous avez ou si vous avez eu :

- Des antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.
- Des antécédents de convulsion.
- Des antécédents de maladie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier ou très lent).
- De l'asthme ou certaines maladies pulmonaires chroniques.
- Une maladie du foie ou une hépatite.
- Des difficultés à uriner ou une maladie des reins.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartame.

Prévenez aussi votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être.

Interactions avec d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Ceci s'applique aussi aux médicaments que vous pouvez prendre ultérieurement pendant votre traitement par KYNCEPT®. Ces médicaments peuvent en effet diminuer ou augmenter l'effet de KYNCEPT®.

Prévenez votre médecin notamment si vous prenez un des traitements suivants :

- Autre traitement pour la maladie d'Alzheimer, par exemple galantamine.
 - Traitements anti-douleur ou anti-arthrose, par exemple aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l'ibuprofène ou le diclofénac.
 - Traitement anticholinergique, par exemple toltrérodine.
 - Traitement antibiotique, par exemple érythromycine, rifampicine.
 - Traitement anti-fongique, par exemple kétoconazole.
 - Traitement anti-dépresseur, par exemple fluoxétine.
 - Traitement anti-convulsivant, par exemple phénytoïne, carbamazépine.
 - Traitement pour une maladie cardiaque, par exemple quinidine, bêta-bloquant (propranolol, aténolol).
 - Traitement relaxant musculaire, par exemple diazépam, succinylcholine.
 - Anesthésiques par voie générale.
 - Traitements obtenus sans ordonnance, par exemple phytothérapie.
- Si vous avez besoin d'une opération nécessitant une anesthésie générale, vous devez informer le médecin que vous prenez KYNCEPT®. Votre traitement peut modifier la quantité d'anesthésique nécessaire.

KYNCEPT® peut être utilisé chez les patients avec une maladie des reins ou une maladie légère à modérée du foie. Prévenez votre médecin si vous présentez une maladie des reins ou du foie. Les patients atteints d'une maladie grave du foie ne doivent pas prendre KYNCEPT®.

Interactions avec les aliments et les boissons :

La prise de nourriture ne modifie pas l'effet de KYNCEPT®.

KYNCEPT® ne doit pas être pris avec de l'alcool, l'alcool peut modifier son effet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

KYNCEPT® ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez l'être, demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

La maladie d'Alzheimer peut être responsable de difficultés lors de la conduite de véhicule ou lors de l'utilisation d'une machine. En cas de maladie d'Alzheimer, ces activités sont à éviter sauf avis contraire de votre médecin.

Votre traitement peut occasionner fatigue, vertiges et crampes musculaires. Si vous présentez un de ces effets vous ne devez pas conduire de véhicule ou utiliser de machines.

3. COMMENT PRENDRE KYNCEPT® ?

Posologie, Mode et/ou voie d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement : Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Posologie :

En règle générale, le traitement débutera par un comprimé à 5 mg tous les soirs. Après un mois de traitement, votre médecin peut augmenter cette posologie à 10 mg tous les soirs avant le coucher. Le comprimé doit être placé sous la langue pour permettre sa désintégration avant de l'avaler, avec ou sans eau, pendant ou après le repas.

Le dosage des comprimés que vous allez prendre et la durée de votre traitement peuvent varier en fonction des recommandations de votre médecin. La posologie maximale recommandée est de 10 mg par jour.

Respectez attentivement la prescription de votre médecin et les conseils de votre pharmacien quant au moment et à la fréquence de la prise du médicament. Ne pas modifier la dose sans l'avis de votre médecin.

Durée de traitement :

Votre médecin ou votre pharmacien vous indiquera la durée du traitement. Vous devrez voir votre médecin de façon régulière pour ajuster votre traitement et évaluer vos symptômes.

Ne pas interrompre le traitement sans consulter votre médecin. Si vous arrêtez de prendre KYNCEPT®, le bénéfice de votre traitement diminuera progressivement.

Symptômes et instructions en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de KYNCEPT® que vous n'auriez dû :

Ne pas prendre plus d'un comprimé par jour. Contactez immédiatement votre médecin en cas de dépassement de la dose prescrite. En cas d'impossibilité à joindre un médecin, se rendre aussitôt au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Prenez toujours les comprimés et la boîte avec vous à l'hôpital afin que le médecin sache ce que vous avez pris.

Les symptômes suivants peuvent apparaître en cas de prise d'une quantité excessive : nausées, vomissements, salivation, transpiration, ralentissement du rythme cardiaque, diminution de la tension artérielle (sensation de tête vide, vertiges lors du passage en position debout) troubles respiratoires, perte de connaissance ou convulsions.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre KYNCEPT® :

En cas d'oubli de prise d'un comprimé, prendre un seul comprimé le lendemain à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser celle que vous avez oublié de prendre. En cas d'oubli de prise pendant plus de 1 semaine, consultez votre médecin avant toute reprise du traitement.

Risque de syndrome de sevrage

Ne pas interrompre le traitement sans consulter votre médecin. Si vous arrêtez de prendre KYNCEPT®, le bénéfice de votre traitement diminuera progressivement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, KYNCEPT® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés par les personnes prenant le donépézil.

Prévenez votre médecin si vous avez un de ces effets indésirables pendant que vous prenez KYNCEPT®.

Effets indésirables graves :

Si vous ressentez les symptômes suivants après avoir pris ce médicament, veuillez en informer votre médecin. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical d'urgence.

• Atteinte du foie, par exemple hépatite. Les symptômes de l'hépatite sont : nausées, vomissements, perte de l'appétit, mauvais état général, fièvre, décoloration jaune de la peau et des yeux, urines foncées (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 10 000).

• Ulcère gastrique ou duodénal. Les symptômes des ulcères gastriques ou duodénaux sont douleur ou inconfort (indigestion) entre le nombril et le sternum (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 1 000).

• Hémorragie gastrique ou intestinale. Ceci peut être responsable de selles noires ou de la présence de sang dans les selles (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 1 000).

• Convulsions (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 1 000).

• Fièvre avec raideur musculaire, transpiration ou altération de la conscience (trouble appelé « syndrome malin des neuroleptiques ») (pouvant toucher moins de 1 personne sur 10 000).

Effets indésirables très fréquents (pouvant toucher plus de 1 patient sur 10)

• Diarrhée.

• Nausées, vomissements.

• Maux de tête.

Effets indésirables fréquents (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 100)

• Crampes musculaires.

• Fatigue.

• Difficulté à trouver le sommeil (insomnie).

• Rhume.

• Perte de l'appétit.

• Hallucinations (voir ou entendre des choses qui n'existent pas).

• Agitation.

• Agressivité.

• Rêves anormaux et cauchemars.

• Syncope.

• Vertiges.

• Douleurs abdominales.

• Eruption cutanée.

• Démangeaison.

• Incontinence urinaire.

• Douleurs.

• Accidents (les patients sont plus susceptibles de tomber et de se faire mal).

Effets indésirables peu fréquents (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 1 000)

• ralentissement du rythme cardiaque.

Effets indésirables rares (pouvant toucher 1 à 10 patients sur 10 000)

• rigidité et difficulté à réaliser des mouvements, mouvements incontrôlables spécialement de la face et de la langue mais aussi des membres.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER KYNCEPT® ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

KYNCEPT® doit être conservé dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité à une température inférieure à 30°C.

6. QUE CONTIENT KYNCEPT® ?

La substance active est dénommée : Donépézil chlorhydrate.

KYNCEPT® 5mg, comprimés oro-dispersibles : Chaque comprimé contient 5mg de donépézil chlorhydrate.

Excipients : dioxyde de silicium colloïdal, stéarylfumarate de sodium, croscopovidone, carraghénane, laurylsulfate de sodium, mannitol, aspartame, arôme de fraise.

Excipient à effet notoire :

aspartame. Chaque comprimé oro-dispersible de KYNCEPT® 5mg contient 3,46mg d'aspartame.

KYNCEPT® 10mg, comprimés oro-dispersibles : Chaque comprimé contient 10mg de donépézil chlorhydrate.

Excipients : mannitol, cellulose microcristalline, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, dioxyde de silicium colloïdal, carraghénane, croscopovidone, stéarate de magnésium, silicate de calcium, aspartame, arôme de menthe.

Excipient à effet notoire :

aspartame. Chaque comprimé oro-dispersible de KYNCEPT® 10mg contient 1,50mg d'aspartame.

7. OU OBTENEZ-VOUS KYNCEPT® ? QUELS SONT LES EMBALLAGES MIS A DISPOSITION SUR LE MARCHE ?

En pharmacie, uniquement sur ordonnance médicale.

KYNCEPT® existe sous forme de :

Comprimés oro-dispersibles à 5mg : Chaque boîte en carton contient 30 comprimés.

Comprimés oro-dispersibles à 10mg : Chaque boîte en carton contient 30 comprimés.

Liste I

Décision d'enregistrement N° :

KYNCEPT® 5 mg, comprimés oro-dispersibles : 17/15F103/352

KYNCEPT® 10 mg, comprimés oro-dispersibles : 17/15F104/352

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 05/2017

Fabricant, conditionneur et détenteur de la décision d'enregistrement :

EL KENDI industrie du médicament

Siège social : Haouch Kaouch N°2, villa N° 14, Dely Brahim - Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda - Alger.

دونيبيزيل كلور هيدرات، أقراص قابلة للذوبان في الفم ذات 5 مغ / عن طريق الفم.
دونيبيزيل كلور هيدرات، أقراص قابلة للذوبان في الفم ذات 10 مغ / عن طريق الفم.

1. ما هو كينسابت® وما هي الحالات التي يستعمل فيها؟

يستعمل كينسابت® في مجموعة من الأدوية تسمى "مشبجات الأسيتيل كولينستيراز". يزيد الدونيبيزيل من تركيز مادة (الأسيتيل كولين) في الدماغ التي تشارك في عملية التفكير عن طريق الحد من تدمير الأسيتيل كولين.

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كينسابت®؟

يستعمل كينسابت® لعلاج أعراض الأشكال من خفيفة إلى شديدة لمرض الزهايمر. تشمل أعراض مرض الزهايمر فقدان التدريجي للذاكرة، الارتباك والتغيرات السلوكية. وبالتالي يصبح من الصعب على نحو متزايد تنفيذ أنشطة الحياة اليومية.
يستعمل كينسابت® لدى البالغين فقط.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول كينسابت®؟

موانع الاستعمال:
لا تتناولوا أبدا كينسابت® في الحالات التالية:
• إذا كنتم تعانيون من أرجية تجاه الدونيبيزيل أو مشبجات البيبيريدين أو أحد المكونات الأخرى المحتواة في كينسابت®.

• نظرا لوجود الأسبارتام، لا يجب استعمال هذا الدواء في حالة بيلة الغلوتامين.
في حالة التشنج، من الضروري استشارة طبيبكم أو صيدليكم.

محاذير الاستعمال، تحذيرات خاصة:

اخذروا مع كينسابت®:
أعطوا طبيبكم أو صيدليكم قبل تناول كينسابت® إذا كنتم تعانيون حاليا أو عاقبت من قبل من:
• سوابق لفرقة المعدة أو الاثني عشر.

• سوابق لاختلاجات.
• سوابق لمرض القلب (عدم انتظام أو بطء نظم القلب).
• مرض الربو أو بعض الأمراض الرئوية المزمنة.

• مرض في الكبد أو التهاب الكبد.
• صعوبات في التبول أو مرض في الكلى.
• في حالة المعاناة من بيلة الغلوتامين (مرض وراثي يكشف عنه عند الولادة)، وذلك بسبب وجود الأسبارتام.

أعلمي طبيبكم إذا كنت حامل أو إذا كنت تعتدين ذلك.
التفاعلات مع الأدوية الأخرى:

يرجى إعلام طبيبكم أو صيدليكم إذا كنتم تتناولون أو تناولتم مؤخرا أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية. هذا ينطبق أيضا على الأدوية التي يمكنكم تناولها لاحقا خلال فترة العلاج بـ كينسابت®. هذه الأدوية يمكن أن تقلل أو تزيد من تأثير كينسابت®.

أعلموا طبيبكم إذا كنتم تأخذون أي من العلاجات التالية:
• علاج آخر لمرض الزهايمر، مثل الفالانتامين.
• علاج بالمسكنات أو مضادات التهابات المفاصل، مثل الأسبرين، مضادات الالتهاب الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين أو الديكلوفيناك.

• العلاج بمضادات الكولين، مثل التوتريدين.
• العلاج بالمضادات الحيوية، مثل الأزيثروميسين، الريفامبين.
• العلاج بالمضادات للفطريات، مثل الفلوكونازول.
• العلاج بالمضادات للاكتئاب، مثل الفلوكزيتين.

• العلاج بمضادات الاختلاج، مثل الفينيتوين، الكاربامازيبين.
• علاج لمرض في القلب، مثل الكينيدين، حاصرات بيتا (الدينيولول، الأيتنولول).
• العلاج المرحي للعضلات، مثل الديزايپام، الموسكيبين كولين.

• التخدير العام.
• العلاجات التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية، مثل التدوي بالاعشاب.
إذا كنتم بحاجة إلى عملية جراحية تتطلب التخدير العام، يجب إبلاغ طبيبكم أنكم تتناولون كينسابت®.

علاكم قد يؤدي إلى تغيير كمية المخدر المتطلب استعمالها.
يمكن استعمال كينسابت® عند المرضى الذين يعانون من مرض في الكلى أو مرض في الكبد من خفيف إلى معتدل. أعطوا طبيبكم إذا كنتم تعانيون من مرض في الكلى أو الكبد. المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد الشديدة لا ينبغي أن يتناولوا كينسابت®.

التفاعلات مع الطعام والشراب:
تتوالى الطعام لا يغير من تأثير كينسابت®.
لا يجب تناول كينسابت® مع الكحول، الكحول قد يغير من تأثيره.

الاستعمال خلال الحمل والإرضاع:
لا يجب تناول كينسابت® أثناء الرضاعة الطبيعية.
إذا كنت حامل أو تعتدين ذلك، استشيري طبيبكم قبل تناول أي دواء.

الأثر على القدرة على قيادة المركبات أو استعمال الآلات:
مرض الزهايمر قد يكون مسؤول عن صعوبات في قيادة المركبات أو استعمال الآلات. في حالة مرض الزهايمر، يجب تجنب هذه الأنشطة إلا إذا كان رأي طبيبكم مخالف.

قد يسبب العلاج تعب، دوخة وتشنجات عضلية. إذا كنتم تعانيون من أحد هذه الآثار لا يجب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.

3. كيف يتم تناول كينسابت®:

الجرعة، طريقة وأو سبيل الاستعمال، تردد الاستعمال ومدة العلاج:
في جميع الحالات، عليكم دائما باحترام جرعة كينسابت® التي وصفها لكم طبيبكم.
الجرعة:

عادة، يبدأ العلاج بتناول قرص 5 مغ كل ليلة. بعد شهر من العلاج، طبيبكم قد يزيد جرعتكم إلى 10 مغ كل ليلة قبل النوم.

يجب وضع القرص تحت اللسان للسماح بتمككه قبل بلعه، مع أو بدون ماء أثناء أو بعد تناول الطعام. يمكن أن تتغير جرعة الأقراس التي سوف تتناولونها ومدة علاكم حسب توصيات طبيبكم. الجرعة القصوى الموصى بها هي 10 مغ في اليوم.

احترموا وصفة طبيبكم واتصاح صيدليكم فيما يتعلق بوقت وتردد استعمال هذا الدواء. لا يجب تغيير الجرعة دون استشارة طبيبكم.
مدة العلاج:

سوف يخبركم طبيبكم أو صيدليكم عن مدة العلاج. يجب عليكم استشارة طبيبكم بانتظام لضبط علاكم وتقييم الأعراض الخاصة بكم.
لا تتوقفوا عن علاكم دون استشارة طبيبكم. إذا توقفت عن تناول كينسابت®، فإن التأثير الإيجابي لعلاكم سينخفض تدريجيا.

الأعراض والإرشادات في حالة فرط في الجرعة:
إذا تناولتم كينسابت® أكثر مما يجب:
لا تتناولوا أكثر من قرص واحد يوميا. اتصلوا بطبيبكم على الفور إذا تجاوزتم الجرعة الموصوفة في حالة عدم القدرة على الاتصال بالطبيب، تتلقوا على الفور على قسم الطوارئ في أقرب مستشفى.

خذوا دائما معكم الأقراس وعلية الدواء إلى المستشفى لكي يعرف الطبيب ماذا تناولتم. قد تظهر الأعراض التالية عند تناول جرعة زائدة: غثيان، قيء، دوخة، ارتباك، بطء نظم القلب، انخفاض ضغط الدم (الدوخة عند الانتقال إلى وضعية الوقوف)، اضطرابات في الجهاز التنفسي، إغماء أو اختلاجات.

الأعراض والإرشادات في حالة تسميم جرعة أو عدة جرعات:
إذا تسممت تناول كينسابت®:
إذا نسيت تناول قرص واحد، تناولوا قرص واحد في اليوم التالي في الوقت المعتاد. لا تتناولوا جرعة

مضاعفة تعويض الجرعة المفقودة. إذا نسيت تناول جرعتكم لمدة تتجاوز الأسبوع، استشرىوا طبيبكم قبل العودة للعلاج.

خطر متلازمة الغطام:

لا تتوقفوا عن العلاج دون استشارة طبيبكم. إذا توقفت عن تناول كينسابت®، فإن التأثير الإيجابي لعلاكم سينخفض تدريجيا مع الوقت.

4. ما هي الآثار الجانبية المعتمنة؟

كسائر الأدوية، يمكن لكينسابت® أن يسبب أعراضا جانبية، مع العلم أنها قد لا تظهر عند جميع الأشخاص.
لقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية التالية من قبل الأشخاص الذين يتناولون الدونيبيزيل.

أعلموا طبيبكم إذا عاقبت من أحد الآثار الجانبية التالية عند تناول كينسابت®.
آثار جانبية خطيرة:

إذا عاقبت من أحد الأعراض التالية بعد تناول هذا الدواء، أعطوا طبيبكم. قد تحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
• إصابة في الكبد مثل التهاب الكبد. أعراض التهاب الكبد: غثيان، قيء، فقدان الشهية، حالة عامة سيئة، حمى، حكة، اصفرار الجلد أو العينين، لون داكن للبول (يمكن أن تصيب من 1 إلى 10 مرضى على 10000 مريض).

• فرقة المعدة أو الاثني عشر. أعراض فرقة المعدة أو الاثني عشر هي الألم أو عدم الراحة (عسر الهضم) بين السرة وعظمة الفص (يمكن أن تصيب 1 إلى 10 مرضى على 1000 مريض).
• تزيق في المعدة أو في الأمعاء. قد يكون هذا مسوولا عن براز أسود أو تواجد الدم في البراز (يمكن أن تصيب من 1 إلى 10 مرضى على 1000 مريض).

• تشنجات مرفوقة بحصى (يمكن أن تصيب من 1 إلى 10 مرضى على 1000 مريض).
• حمى مع تصلب العضلات، تعرق أو اضطراب في الوعي (اضطراب يسمى "متلازمة الدهان الخبيثة") (يمكن أن تصيب أقل من 1 مرضى على 10000 مريض).

آثار جانبية متكررة جدا (يمكن أن تصيب أكثر من 1 مريض على 10 مرضى).
• إسهال.
• غثيان، قيء.
• صداع.

آثار جانبية متكررة (يمكن أن تصيب من 1 مريض على 10 مرضى على 100 مريض).
• تشنجات عضلية.
• تعب.

• صعوبة النوم (الأرق).
• نزلة برد.
• فقدان الشهية.
• هلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة).

• أرق.
• عدوانية.
• أحلام غير طبيعية والكوابيس.
• إغماء.
• دوخة.

• آلام في البطن.
• ملغ جلدي.
• حكة.
• سلس البول.
• آلام.

• حوادث (مرضى الزهايمر أكثر عرضة للسقوط والتضرر).
آثار جانبية قليلة التردد (يمكن أن تصيب من 1 إلى 10 مرضى على 1000 مريض).
• سلاية وصعوبة في تنفيذ الحركات، حركات لاإرادية خصوصا في الوجه والسان ولكن أيضا في الأطراف.

لا لاحظتم آثارا جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أو إذا أصبحت بعض الآثار الجانبية خطيرة، أعطوا طبيبكم أو صيدليكم.

5. كيف يحفظ كينسابت®؟

يحفظ كينسابت® بعيدا عن متناول أيدي وروية الأطفال.
لا يستعمل هذا الدواء بعد انتهاء مدة الصلاحية المذكورة على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر.
يحفظ كينسابت® في العبوة الأصلية، بعيدا عن الرطوبة في درجة حرارة أقل من 30°م.

6. ماذا يحتوي كينسابت®؟

المادة الفعالة تسمى دونيبيزيل كلور هيدرات.
كينسابت® 5 مغ، أقراص قابلة للذوبان في الفم: يحتوي كل قرص على 5 مغ من دونيبيزيل كلور هيدرات.

السواغات: ثاني أكسيد السيليكون الغروي، فورمات ستيريل الصوديوم، كروسوفيتون، الكاراجينان، كبريتات لورين الصوديوم، مانيتول، الأسبارتام، نكهة الفراولة.

السواغات ذات التأثير المعوم: الأسبارتام.
كل قرص قابل للذوبان في الفم من كينسابت® 5 مغ يحتوي على 3.46 مغ من الأسبارتام.

كينسابت® 10 مغ، أقراص قابلة للذوبان في الفم: يحتوي كل قرص على 10 مغ من دونيبيزيل كلور هيدرات.

السواغات: مانيتول، سيلوز دقيق البلورات، هيدروكسي بروبيل السيلولوز ضعيف الاستبدال، ثاني أكسيد السيليكون الغروي، الكاراجينان، كروسوفيتون، ستيرات المغنسيوم، سيلكات الكالسيوم، الأسبارتام، نكهة النعناع.

السواغات ذات التأثير المعوم: الأسبارتام.
كل قرص قابل للذوبان في الفم من كينسابت® 10 مغ يحتوي على 1.50 مغ من الأسبارتام.

7. أين تحصلون على كينسابت®؟ ماهي التحفظات الموجودة في السوق؟

في الصيدلية، فقط بوصفة طبية.
كينسابت® متوفر على شكل:
أقراص قابلة للذوبان في الفم ذات 5 مغ: كل علبه من الورق المغوي تحتوي على 30 قرص.
أقراص قابلة للذوبان في الفم ذات 10 مغ: كل علبه من الورق المغوي تحتوي على 30 قرص.

قائمة ا

مقر التسجيل رقم:

كينسابت® 5 مغ، أقراص قابلة للذوبان في الفم: 17/15F103/352

كينسابت® 10 مغ، أقراص قابلة للذوبان في الفم: 17/15F104/352

آخر تاريخ تم فيه مراجعة هذه النشرة: 2017/05

المصنّع، المعين وصاحب مقر التسجيل:

المقر الإقليمي: حوش فوش رقم 2 منزل رقم 14 دالي براهيم - الجزائر العاصمة.

المصنّع: المنطقة الصناعية سوي عبد الله، زراند - الجزائر العاصمة.