NOLVADEX 10 mg et 20 mg

TAMOXIFENE

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

NOLVADEX 10 mg

CITRATE DE TAMOXIFENE .....15,20 mg
Quantité correspondante à tamoxifène base .....10,00 mg

excipient : lactose monohydraté, amidon de maïs, gélatine, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 300, dioxyde de titane (E 171).

NOLVADEX 20 mg

CITRATE DE TAMOXIFENE .....30,40 mg
Quantité correspondante à tamoxifène base .....20,00 mg

excipient : lactose, amidon de maïs, gélatine, carboxymethylcellulose réticulée sodique, stéarate de magnésium. Enrobage : hypromellose, polyéthylène glycol 300, dioxyde de titane.

FORME PHARMACEUTIQUE

Nolvadex 10 mg : Comprimé pelliculé
Nolvadex 20 mg : Comprimé enrobé

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIESTROGENE

Exploitant

ASTRAZENECA
1, place Renault
92844 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Fabricant

AstraZeneca Reims
Site : Chemin de Vrilly
BP 1050
51689 REIMS Cedex 2

1. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans certaines maladies de la glande mammaire.

2. ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE

FREQUENCE ET MOMENT AUX QUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Le traitement est administré, selon les cas, en une ou deux fois par jour.

DUREE DU TRAITEMENT

Elle est variable d'une patiente à l'autre et est déterminée par votre médecin traitant.

CONDUITE A TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE

Prévenez votre médecin et, de toutes façons, continuez le traitement comme précédemment.

4. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

- Chez toutes les femmes, quel que soit leur âge, peuvent survenir :
  - des anomalies de l'utérus (cancer de l'utérus dont cancer de l'endomètre) pouvant se manifester par des saignements qui doivent amener à consulter rapidement,
  - des accidents thrombo-emboliques (formation de caillots au niveau des vaisseaux sanguins),
  - des troubles visuels,
  - des bouffées de chaleur, des démangeaisons au niveau de la vulve,
  - des nausées qui cèdent en fractionnant les prises,
  - des pertes gynécologiques peu importantes,
  - des éruptions cutanées parfois sévères, des réactions allergiques, une chute des cheveux,
  - des maux de tête,
  - des modifications biologiques portant sur les globules blancs, globules rouges, plaquettes enzymes du foie,
  - des douleurs au niveau du sein et très rarement des oedèmes,
  - des cas d'hypertriglycéridémie (augmentation des triglycérides) ou de pancréatite (inflammation du pancréas),
  - une maladie du poumon,
  - des douleurs articulaires et/ou musculaires.
- Si vous n'êtes pas ménopausée :
  - des troubles des règles peuvent se produire ; dans certains cas, on peut même observer l'arrêt des règles

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de grossesse, d'allaitement et d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le traitement nécessite une surveillance clinique et biologique régulière.
Prévenir votre médecin si vous avez une hypertriglycéridémie (augmentation des triglycérides).
En cas de saignement vaginal anormal, il importe de consulter au plus vite votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT:

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'allaitement est contre indiqué.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Les risques de troubles visuels peuvent rendre dangereux la conduite automobile ou l'utilisation de certaines machines.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS.

Lactose

3. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Il importe de se conformer strictement à celle que vous a prescrite votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

- Si vous n'êtes pas ménopausée :
  - des troubles des règles peuvent se produire ; dans certains cas, on peut même observer l'arrêt des règles,
  - des kystes de l'ovaire et/ou des saignements utérins qui doivent amener à consulter rapidement.

Ces troubles doivent toujours être signalés au médecin qui a en charge le traitement.

5. CONSERVATION

a) NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

b) PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

6. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

6 février 2007

[NOL 10 ANIIIB 0207.1]
[NOL 20 ANIIIB 0207.1]

Liste 1

NOLVADEX 10 mg : DE : 99/09B 004/171
NOLVADEX 20 mg : DE : 99/09B 075/171

© AstraZeneca 2002-2011
Marques déposées – Propriété de AstraZeneca

le réflexe CYCLAMED

AstraZeneca cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. AstraZeneca participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. AstraZeneca vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

AstraZeneca