NOTICE

ONCOTAM 20 mgTamoxifène sous forme de comprimés à 20 mg.Action
Médicament faisant partie de la famille des antiestrogènes : il bloque l'action des oestrogènes, qui est de stimuler le tissu mammaire (sein) et l'utérus.
Le tamoxifène reproduit en quelque sorte le mécanisme de la ménopause naturelle mais pas de la même manière. En effet, si la ménopause correspond à une diminution de la sécrétion des oestrogènes, le tamoxifène ne diminue pas cette sécrétion mais empêchent ces hormones d'avoir une quelconque action sur les seins et l'utérus.

Indication
Traitement du développement anormal du sein.

Posologie
20 à 40 mg par jour en 1 ou 2 prises.

Contre-indications
· Grossesse et allaitement
· Utilisation des contraceptifs oraux contenant des oestrogènes

Effets indésirables
· Accident thrombo-embolique (phlébite, embolie pulmonaire)
· Anomalie de la formule-numération sanguine : NFS (nombre de globules blancs, de globules rouges et de plaquettes)
· Atteinte pancréatique
· Augmentation des transaminases (enzymes libérées par le foie en cas de lésions de celui-ci)
· Augmentation des triglycérides
· Bouffées de chaleur
· Déficit de développement de l'endomètre (couche cellules recouvrant l'intérieur de l'utérus) pouvant entraîner des saignements intermittents
· Douleurs des seins
· Nausées
· Pertes blanches
· Prurit (démangeaisons)
· Rétention d'eau
· Troubles de la vision

Précautions d'emploi
Une surveillance régulière, plus spécifiquement gynécologique, par une équipe médicale est nécessaire.
· L'augmentation des triglycérides (variété de lipides, corps gras) dans le sang
· Des antécédents d'embolie pulmonaire (présence de caillot sanguin dans les artères de l'appareil pulmonaire)
· Des antécédents de phlébite (présence de caillot sanguin dans les veines) ?nécessitent une surveillance et des précautions d'emploi.

Grossesse et allaitement
Le tamoxifène est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement.

Interactions médicamenteuses
L'association avec des anticoagulants nécessite une surveillance étroite

Remarque
Ce médicament n'est pas un contraceptif oral.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6 AVENUE DE L'EUROPE

BP 51

78401 CHATOU CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, AVENUE DE L'EUROPE

BP 51

78401 CHATOU CEDEX

Fabricant

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, AVENUE DE L'EUROPE

BP 51

78401 CHATOU CEDEX

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE

Le magnésium est un élément minéral, essentiel pour l'organisme, qui participe à de nombreuses réactions enzymatiques et au bon fonctionnement des muscles. On trouve le magnésium dans beaucoup d'aliments; une alimentation équilibrée et suffisante couvre théoriquement les besoins quotidiens (légumes verts, céréales complètes, fruits et légumes secs, chocolat, certaines eaux minérales).

Cependant si vous présentez une succession de signes pouvant évoquer un manque de magnésium (irritabilité, fatigue, difficulté à dormir, crampes musculaires …) un apport complémentaire peut être utile. Respectez alors les doses et la durée de traitement de MEGAMAG 45 mg, gélule indiquées dans cette notice.