Zinoximor®

Céfuroxime (axétil) 250 mg, 500 mg
Comprimés

Présentations:
Zinoximor 250 mg: Boîte de 14 comprimés pelliculés.
Zinoximor 500 mg: Boîte de 14 comprimés pelliculés.
Des conditionnements pour hôpital sont disponibles.

Composition:
Zinoximor 250 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Céfuroxime axétil équivalent à 250 mg de céfuroxime.
Zinoximor 500 mg: Chaque comprimé pelliculé contient: Céfuroxime axétil équivalent à 500 mg de céfuroxime.
Excipients: Cellulose microcristalline, sodium lauryl sulfate, sodium de croscarmellose, dioxyde de silice colloïdale, lubritab, methocel E15, propylèneglycol, polyéthylène glycol 4000, dioxyde de titane, talc, chlorure de méthylène, alcool isopropylique.

Propriétés:
Zinoximor est le nom commercial de comprimés pelliculés de céfuroxime axétil, qui est une prodrogue orale qui se convertit en un antibiotique bactéricide de la classe des céphalosporines. Ce produit inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se fixant à des protéines cibles essentielles. Résistant à la plupart des bêta-lactamases, il est également actif contre un large éventail de micro-organismes à Gram positif et à Gram négatif.

Indications:
Zinoximor est indiqué dans le traitement des infections suivantes chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 12 ans:
- Angine et pharyngite aiguës à streptocoque.
- Sinusite bactérienne aiguë.
- Otite moyenne aiguë.
- Exacerbations aiguës de bronchite chronique.
- Cystite.
- Pyélonéphrite.
- Infections non compliquées de la peau et des tissus mous.
- Traitement de la maladie de Lyme à un stade précoce.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Contre-indications:
Zinoximor est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité à la classe des antibiotiques à base de céphalosporine ou à l'un des excipients.

Précautions d'emploi:
- Un usage prolongé est susceptible de provoquer une prolifération de micro-organismes non sensibles à ce produit.
- La prudence est recommandée chez les patients présentant des antécédents d'anaphylaxie aux pénicillines en raison de la possibilité d'une réaction croisée.

Interactions médicamenteuses:
- Le probénécide réduit l'excrétion de la céfuroxime.
- Il convient de réduire la dose de **Zinoximor** et de surveiller la fonction rénale chez les patients présentant une insuffisance rénale. Ce médicament doit être donné avec prudence chez les patients prenant déjà des diurétiques, dans la mesure où cette association est susceptible de modifier la fonction rénale.
- Un usage concomitant de la céfuroxime avec certains médicaments tels que la vancomycine, la colistine, la polymixine et les aminosides est susceptible d'augmenter le risque de néphrotoxicité.

Mises en garde:
La céfuroxime peut être à l'origine de résultats faux négatifs ou faux positifs avec les tests au ferricyanure, au réactif de Benedict ou à la liqueur de Fehling. En conséquence, il est recommandé de déterminer la concentration en sucre dans le sang par les méthodes enzymatiques type glucose oxydase ou hexokinase.

Grossesse et allaitement:
La prudence est de rigueur en cas de grossesse et d'allaitement.

Effets sur l'aptitude a conduire des vehiclues et a utiliser des machines:
Non applicable.

Posologie et mode d'administration:
Zinoximor doit être pris après les repas afin de permettre une meilleure absorption.
Adulte:
La plupart des infections répondent généralement à 250 mg deux fois par jour.
Pour les infections sévères et/ou compliquées, la dose peut être augmentée à 500 mg deux fois par jour.
Traitement séquentiel:
Pneumonie: 1,5 g de céfuroxime sodique deux fois par jour (IV ou IM) pendant 48 à 72 heures, suivi par 500 mg deux fois par jour de traitement oral par **Zinoximor** pendant 5 à 7 jours.
La durée des deux traitements, parentéral et oral, est déterminée par la sévérité de l'infection et par l'état clinique du patient.
Chez l'enfant:
La dose recommandée est de 125 à 250 mg deux fois par jour dans la plupart des infections.
Dans l'otite moyenne, la dose peut être augmentée jusqu'à un maximum de 500 mg par jour en plusieurs doses.

Surdosage:
La concentration sérique de céfuroxime peut être réduite par hémodialyse ou dialyse péritonéale.

Effets indésirables:
Les effets indésirables généraux les plus fréquents sont:
- Troubles gastro-intestinaux: Diarrhée, nausées et vomissements.
- Hématologique: Diminution de l'hémoglobine, éosinophilie.
- Réactions allergiques: Eruptions cutanées et fièvre.
- Fonctions hépatiques: Élévation transitoire des enzymes hépatiques.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous observez un quelconque effet indésirable.

Précautions pharmaceutiques:
Conserver à une température ambiante (inférieure à 30°C).
Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le produit présente des signes de détérioration.

Tableau A (Liste I).

Date de révision de la notice: 07/2014
Décision d'enregistrement numéro:
Zinoximor 250 mg: 2006/13B208/173
Zinoximor 500 mg: 06/13B296/173

® est une marque déposée.

Ceci est un médicament
- Un médicament est un produit qui utilisé en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Conseil des Ministres Arabes de la Santé & Union des Pharmaciens Arabes.

tabuk pharmaceuticals

July 2014
24204/R8

Fabricant/Conditionneur/Détenteur de la D.E:
Tabuk Pharmaceutical Mfg. Co.,
Madina Road, P.O. Box 3633, Tabuk - Arabie Saoudite.