DOXYLINE®

Doxycycline Hyclate

Gélules

FORMES ET PRESENTATIONS :

Gélules à 100 mg : Boite de 06 gélules.

COMPOSITION :

Doxycycline hyclate.....100mg.

Excipients :

Stearate de magnésium, Amidon de maïs, Acide alginique. **Lactose*** anhydre.

***** : *Excipient à effet notoire*

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTIBIOTIQUE de la famille des tétracyclines

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes sensibles dans leurs manifestations :

- Les infections des voies respiratoires
- Les infections des voies urinaires
- Les maladies sexuellement transmissibles
- Acné inflammatoire moyenne et sévère et composante inflammatoire des acnés mixtes
- Les infections de l'œil
- Infections telles que la fièvre Coxiella burnetii (fièvre Q).
- D'autres infections comme le paludisme, le choléra, la brucellose, la leptospirose, la psittacose et la fièvre causée par les poux ou les tiques.
- La diarrhée des voyageurs, typhus des broussailles et la leptospirose.

CONTRE INDICATIONS :

-Allergie aux tétracyclines.

- L'emploi de ce médicament est à éviter chez l'enfant de moins de huit ans (risque de coloration permanente des dents et de développement insuffisant de l'émail dentaire).
- Association avec les rétinoïdes administrés par voie orale.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE pendant le deuxième et troisième trimestre de votre grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

En raison des risques de sensibilisation à la lumière, il est conseillé d'éviter de s'exposer directement au soleil et aux rayons ultraviolets pendant le traitement qui doit être interrompu en cas d'apparition de manifestations cutanées à type de rougeur.

Prendre le produit de préférence au cours des repas.

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale ou hépatique.

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours du 1er trimestre de la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou vous envisagez une grossesse, prévenez votre médecin avant de prendre ladoxycycline

La doxycycline est contre-indiqué durant les 2e et 3e trimestres de grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin afin qu'il adapte votre traitement.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

Allaitement :

L'allaitement est déconseillé en cas de traitement par ce médicament.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

INTERACTION MEDICAMENTEUSES :

Ce médicament doit être administré à antiacides et des sels de fer (par exemple à deux heures d'intervalle).

L'association avec les rétinoïdes par voie orale est contre-indiquée

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIERS MEDICAMENTS.

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDCIN OU VOTRE PHARMACIEN.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- voie orale
- Ce médicament doit être pris au cours d'un repas avec verre d'eau et au moins une heure avant le coucher.
- Condition optimale de prise : debout, avec un grand verre d'eau.
- Ne pas administrer ce médicament à jeun afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs (nausées, vomissements)

-Adulte : en moyenne, 200 mg en une prise le premier jour puis 100 mg les jours suivants.

INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES :

Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez, puis prenez la prochaine dose au bon moment.

EFFETS INDESIRABLES :

-Possibilité de troubles digestifs : irritation de l'œsophage, nausée, douleurs de l'estomac, diarrhées, perte d'appétit inflammation de la langue ou de l'intestin, candidoses anogénitales (infections dues à un champignon microscopique).

- Réactions allergiques peu fréquentes : urticaire, éruptions, démangeaisons, œdème de Quincke (gonflement du visage et du cou), allergie généralisée, tâches rouges sur la peau, inflammation de l'enveloppe du cœur, exacerbation d'un lupus érythémateux préexistant (maladie sévère de la peau).
- Coloration anormale des dents et développement insuffisant de l'émail en cas d'administration chez l'enfant au dessous de 8 ans.
- Photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V.), très rares cas d'érythrodermie (maladie sévère de la peau).

-possibilité de modification du bilan sanguin (anémie hémolytique, thrombocytopénie, neutropénie, éosinophilie) pouvant se traduire par une pâleur, une fatigue intense, des saignements de nez ou des gencives, ou une fièvre inexpliquée.

Contactez alors rapidement votre médecin.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

Conservation :

A conserver à une température ne dépassant pas + 30° C.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de la lumière, de l'humidité.

Liste I.

GARDER HORS DE PORTEE DES ENFANTS

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

GROUPE SAIDAL

FILIALE ANTIBIOTICAL MEDEA ALGERIE

Route d'El khemis BP 33 Médéa 26000, ALGERIE

Notice révisée en Juillet 2010