

# Biopamox<sup>®</sup>

Amoxicilline 1g

## COMPOSITION

Amoxicilline sodique équivalent à 1 g d'amoxicilline  
Alcool benzylique..... 150 mg  
Eau pour préparation injectable E.P.P.I..... q.s.p. 5 ml  
Excipient à effet notoire: Alcool benzylique.



## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 01 flacon à 1 g de poudre + une ampoule de solvant.

## CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antibiotique antibactérien de la famille des bêta-lactamines du groupe des aminopénicillines (J : Anti-infectieux).

## INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Pneumopathies aiguës ;
- Surinfections de bronchites aiguës et exacerbation de bronchites chroniques ;
- Infections ORL (otite, sinusite, angine) et stomatologiques ;
- Infections urinaires ;
- Infections génitales masculines et infections gynécologiques ;
- Infections digestives et biliaires ;
- Endocardites, septicémies ;
- Méningites ;
- Maladie de Lyme ;
- Prophylaxie de l'endocardite bactérienne.



## CONTRE-INDICATIONS

- Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines ou à l'un des autres constituants.
  - Mononucléose infectieuse (risque accru de phénomènes cutanés).
  - Association avec le méthotrexate.
  - En raison de la présence d'alcool benzylique, l'ampoule de solvant ne doit pas être utilisée chez l'enfant de moins de 3 ans.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**



## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Méthotrexate, allopurinol.

**Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.**



## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement et la mise en place d'un traitement adapté.
- En cas d'administration de doses élevées d'Amoxicilline, un apport hydrique suffisant doit être assuré, pour réduire les risques de cristallurie.
- A de très fortes concentrations, l'amoxicilline tend à perturber le dosage des paramètres biologiques.

- Traitement de la maladie de Lyme : des réactions de Jarisch-Herxheimer peuvent survenir.
- Tenir compte de la teneur en sodium.

**Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien**



## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

**Grossesse** : L'amoxicilline peut être prescrite pendant la grossesse, si besoin.

**Allaitement** : L'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique. Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.

**D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.**



## COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT

La posologie est fonction de l'indication, de la gravité et du siège de l'infection, de la sensibilité du germe en cause, et du poids du sujet

### Mode et voie d'administration

Voie intra-musculaire stricte.

- Ne pas injecter plus de 1 g d'amoxicilline à la fois chez l'adulte.
- Ne pas injecter plus de 25 mg/kg à la fois chez l'enfant.

### Posologie

Doses usuelles par voie intramusculaire :

- Adulte : 2 g/24h, soit 1 injection de 1 g deux fois par jour.
- Enfant et Nourrisson : 50 mg/kg/24h.

**Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.**

## SURDOSAGE

Les manifestations de surdosage peuvent être d'ordre neuro-psychiques, rénales (cristallurie) et digestives. L'amoxicilline peut être éliminée par hémodialyse.



## EFFETS INDÉSIRABLES

**Comme tout principe actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :**

- Manifestations allergiques : notamment urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique. Eruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non.
- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, candidose, glossite, quelques cas de colite pseudomembraneuse.
- L'administration de fortes posologies de bêta-lactamines, en particulier chez l'insuffisant rénal, peut entraîner des encéphalopathies (troubles de la conscience, mouvements anormaux, crises convulsives).

**Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.**



## CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Tenir à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 25°C. Tenir hors de la portée des enfants.

## LISTE I

Date de révision de la notice : Décembre 2010

Médicament enregistré N° : 10/13G043/293.

Fabricant et détenteur de D.E: Les Laboratoires BIOCARE

R.N. 44 Sidi Kassi Ben M'hidi El Tarf - ALGÉRIE.

436/12/2010

