

INVERTER®

Molsidomine

Forme et Présentation :

Comprimé blanc sécable à 2 mg. Boîte de 40 comprimés.
Comprimé blanc sécable à 4 mg. Boîte de 30 comprimés.

Composition :

Molsidomine (D.C.I) 2mg ou 4mg
Excipients qsp..... 1 comprimé
Excipient à effet notable : Lactose monohydraté.

Classe pharmaco-Thérapeutique :

Autre vasodilatateur en cardiologie

Indications :

Ce médicament est un antiangineux, préconisé dans le traitement préventif de l'angine de poitrine sous toute ses formes.

Contre-indications :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypotension artérielle ;
- Sildénafil (Viagra) : si vous êtes traité par la molsidomine, le sildénafil ne doit pas être utilisé.

Précautions d'emploi :

- * Une légère baisse de la tension artérielle est habituelle. Ce médicament doit être utilisé avec précaution chez les sujets âgés, en cas d'hypovolémie (diminution ou baisse du volume du sang), et chez les sujets déjà traités par une substance vasodilatatrice.
- * En cas d'insuffisance hépatique, il est conseillé d'augmenter la posologie de manière progressive.
- * La substitution aux dérivés nitrés est plus logique que l'association, en raison d'une action commune sur la précharge.

Grossesse et Allaitement :

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Interactions médicamenteuses :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Posologie :

INVERTER® 2mg :

- Angor d'effort (posologie usuelle) :
½ à 1 comprimé 3 fois par jour, en général aux repas du matin, de midi et du soir.
- Angor de repos et angor d'effort sévère :
1 comprimé 4 fois par jour.

INVERTER® 4mg :

- Angor sévère : 1 comprimé 3 fois par jour un 4^e comprimé peut être nécessaire dans certains angors instables rebelles.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Effets indésirables et gênants :

- Maux de tête et légère baisse de la pression artérielle en début du traitement. Ces effets régressent spontanément en quelques jours.
- Exceptionnellement une hypotension orthostatique peut survenir (surtout lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges), troubles digestifs, démangeaisons.

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation :

Ce produit doit être conservé à une température inférieure à + 25° et à l'abri de la lumière.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

INVERTER® est inscrit sur la liste I

INVERTER® 2mg DE : 06/06 C 022/003

INVERTER® 4mg DE : 06/06 C 023/003

NE JAMAIS LAISSER LES MÉDICAMENTS À LA PORTÉE DES ENFANTS



Fabricant et détenteur de la DE
Groupe SAIDAL - BIOTIC - Usine EL-HARRACH - ALGERIE