NIFLURIC® 200mg et 400mg

Morniflumate - suppositoire

FORME ET PRÉSENTATION :
Suppositoires, boite de 10.

COMPOSITION :
Morniflumate .....200 mg ou 400 mg
Excipient: glycérides hémi synthétiques q.s.p...1 suppositoire

DANS QUELS CAS UTILUSER CE MEDICAMENT ?
NIFLURIC 200mg et NIFLURIC 400 mg est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 mois :
- En traitement de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires chroniques.
- En traitement de certaines douleurs dues à une inflammation de la gorge. Des oreilles ou de la bouche.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT? (CONTRE INDICATIONS)
- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté. Notamment autres anti-inflammatoires nom stéroïdiens (aspirine).
- Antécédents d'allergie aux autres constituants du suppositoire.
- Ulcère de l'estomac du duodénum en évolution.
- Maladies graves du foie.
- Maladies graves du rein.
- Inflammations ou saignements récents du rectum (liée à la voie d'administration).
- Enfants de moins de six mois.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments ; il faut signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien, notamment autre anti-inflammatoire non sréroidien, anticoagulant oraux, aspirine à forte dose, héparine injectable, lithium, methotrexate à forte dose, ticlopidine.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
Comme tout médicament NIFLURIC 200 mg et NIFLURIC 400 mg, suppositoires, est susceptible d'avoir des effets indésirables. Il est indispensable d'arrêter immédiatement le traitement et d'avertir votre médecin en cas :
- de réactions allergiques cutanées de type éruption sur la peau, de démangeaisons,fortes réactions de la peau lors d'une exposition au soleil ou aux UV.
- de réaction allergique de type crise d'asthme
- de réaction générale de type choc allergique.
- d'hémorragies digestives.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ SUR CETTE NOTICE

COMMENT UTILISER NIFLURIC 200 MG ET NIFLURIC 400 MG SUPPOSITOIRES.

Mode et voie d'administration :
voie rectale.

Posologie :
elle est fonction de l'indication et de l'âge de l'enfant

De 6 mois à 30 mois	**1 suppositoire de NIFLURIC 200 mg 2 fois** par jour.
De 30 mois à 12 ans	**1 suppositoire de NIFLURIC 400 mg par 10 kg de poids et par jour sans dépasser 3 suppositoires par jour.**

L'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison du risque de toxicité locale,
si vous avez pris plus de NIFLURIC 200 mg ou NIFLURIC 400 mg suppositoires que vous n'auriez du consultez imédiatment votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous avez omis de prendre NIFLURIC 200 mg ou NIFLURIC 400 mg suppositoires : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Conserver NIFLURIC 200 mg ou NIFLURIC 400 mg suppositoires entre 15° C et 25° C dans son emballage d'origine.
liste II.

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

D.E. N ° NIFLURIC 200 MG :
10/04B 064/366
D.E. N° NIFLURIC 400 MG :
07/04B 031/366

Fabricant détenteur de DE : 4A SANTE INDUSTRIE
Zone d'activité Oued Fodda - Chlef